

BICLOX® DC DRY COW

ad us. vet.

Suspension zur intramammären Injektion beim Trockenstellen der Milchkühe

ZUSAMMENSETZUNG

Jeder Injektor enthält:

Cloxacillinum 600 mg ut cloxacillinum benzathinum, ampicillinum anhydricum 300 mg, lecithinum, aluminii monostearas, paraffinum liquidum ad suspensionem pro vase 5.4 g.

EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN

Biclox® DC ist eine stabile und nicht reizende Suspension von Cloxacillin und Ampicillin, halbsynthetische Penicillinderivate der 6-amino-Penicillinsäure.

Diese Substanzen sind wirksam gegen Grampositive und Gram negative Erreger der Mastitiden, insbesondere Staphylokokken (auch Penicillin-resistente Stämme), *Streptococcus agalactiae* und die anderen Streptokokken, Corynebakterien, *Escherichia coli*, und die anderen empfindlichen Gram negativen Erreger.

Im Euter wird während der Galtzeit eine wirksame Antibiotika-Konzentration ungefähr 10 Wochen lang aufrechterhalten.

INDIKATIONEN

Behandlung subklinischer Mastitiden, beim Trockenstellen. Vorbeugung gegen neue Infektionen während der Galtzeit.

DOSIERUNG / ANWENDUNG

1 Injektor pro Viertel.

Applikation: intramammär.

Euter zuerst vollständig ausmelken.

Zitzen vor der Applikation sorgfältig reinigen und desinfizieren.

Bis zum Abkalben nicht mehr melken.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Kontraindikationen: Nicht während der Laktation anwenden.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Bei einigen Tieren sind allergische Reaktionen vom Soforttyp beschrieben worden, die mit Unruhe, Zittern, Euterödem sowie mit erhöhter Körpertemperatur einhergehen können.

ABSETZFRISTEN

Minimale Galtzeit: 56 Tage.

Milch: Falls die Galtzeit weniger als 56 Tage beträgt, muss vor der Ablieferung der Milch eine Untersuchung auf Antibiotikarückstände durchgeführt werden.

Essbare Gewebe: Wird ein Tier während der Galtzeit geschlachtet, müssen die essbaren Gewebe auf Hemmstofffreiheit untersucht werden.

SONSTIGE HINWEISE

- Lagerung bei Raumtemperatur (15 – 25°C).
- Ausserhalb der Reichweite von Kinderaufbewahren.
- Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp» bezeichneten Datum verwendet werden.

PACKUNGEN

Packung mit 4 Injektoren.

Packung mit 20 Injektoren.

Packung mit 120 Injektoren.

Swissmedic 53 807 (A)

ATCvet: QJ51RC26

Zulassungsinhaberin

BIOKEMA SA

Crissier-Lausanne

Stand der Information: April 2010.