

Caniquantel® pro Inj. ad us. vet.

Injektionslösung zur Behandlung von Bandwurminfektionen bei Hunden und Katzen

Zusammensetzung

1 ml enthält:
Praziquantelum 56.8 mg
Conservans:
Chlorobutanolum hemihydricum 5 mg
Alcohol benzylicus 75 mg
Propylenglycolum ad solutionem

Eigenschaften / Wirkungen

Praziquantel verursacht bei Bandwürmern eine Schädigung des Teguments und führt zu Membranpermeabilitätsstörungen. Die akute Toxizität bei Mäusen, Ratten und Kaninchen ist nach oraler, subkutaner, intraperitonealer und intramuskulärer Gabe gering. Bei Hunden konnte die akute Toxizität wegen des emetischen Effektes nicht erreicht und daher nicht exakt bestimmt werden. Studien zur chronischen Toxizität und Kanzerogenität ergaben keinerlei Hinweise auf derartige Effekte. Ausserdem konnten bei reproduktionstoxikologischen Untersuchungen keine mutagenen Effekte nachgewiesen werden.

Pharmakokinetik

Praziquantel wird, unabhängig von der Applikationsart, rasch und vollständig resorbiert. Die Halbwertszeit beträgt 1 - 2.5 Stunden. 80 % der verabreichten Dosis werden als Metaboliten innerhalb von 4 Tagen über die Nieren ausgeschieden.

Indikationen

Gegen alle reifen und unreifen Darmstadien von Bandwürmern bei Hunden und Katzen: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia taeniaeformis* (*T. hydatigera*), *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocestoides* spp.

Dosierung / Anwendung

Caniquantel pro Inj. wird intramuskulär oder subkutan verabreicht. Die einmalige Dosierung beträgt für Hunde und Katzen 0.1 ml/kg Körpergewicht, das entspricht 5.7 mg Praziquantel/kg Körpergewicht. Injektionsvolumina von über 3 ml sollen bei subkutaner Injektion auf zwei Stellen verteilt werden.

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Unerwünschte Wirkungen

Die bei schweren Hunden anzuwendenden Injektionsvolumina können bei subkutaner Applikation zu lokalen Reizerscheinungen führen.

Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Gabe von Dexamethason kann zur Herabsetzung der Serumkonzentration von Praziquantel führen.

Sonstige Hinweise

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Unter 30°C und vor Licht geschützt aufbewahren. Aufbrauchsfrist nach 1. Entnahme: 28 Tage. Das Tierarzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

Durchstechflasche zu 10 ml

ZulassungsinhaberIn

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 54'194 (B)
ATCvet-Code: QP52AA01

Stand der Information: April 2007