

# Caniquantel® pro Inj. ad us. vet.

## Solution injectable pour le traitement des infections à cestodes (vers plats) chez le chien et le chat

### Composition

1 ml contient:

Praziquantelum 56.8 mg

Conservans:

Chlorobutanolum hemihydricum 5 mg

Alcohol benzylicus 75 mg

Propylenglycolum ad solutionem

### Propriétés / Effets

Le praziquantel agit contre les cestodes en détruisant le tégument des parasites, ce qui entraîne une modification de la perméabilité de la cellule. Sa toxicité aiguë chez la souris, le rat et le lapin après administration orale, sous-cutanée, intrapéritonéale ou intramusculaire est faible. En raison de l'effet émétique du produit, la toxicité aiguë n'a pas pu être atteinte chez le chien et n'a donc pas pu être évaluée avec précision. Aucun indice suggérant une toxicité chronique et un effet cancérigène n'a été mis en évidence. De même, des tests toxicologiques portant sur la reproduction n'ont pas démontré d'effets mutagènes.

### Pharmacocinétique

Le praziquantel est résorbé rapidement et totalement, indépendamment de la voie d'administration. La demi-vie est de 1 à 2.5 heures. 80 % de la dose administrée est éliminée par voie rénale en l'espace de 4 jours sous forme de métabolites.

### Indications

Traitement des infections à cestodes (adultes et immatures) chez le chien et le chat: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia taeniaeformis* (*T. hydatigera*), *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocestoides* spp.

### Posologie / Mode d'emploi

Administrer Caniquantel pro Inj. par voie intramusculaire ou sous-cutanée.

La dose unique chez le chien et le chat est de 0.1 ml/kg de poids corporel, soit 5.7 mg de praziquantel par kg. Les volumes supérieurs à 3 ml appliqués par voie sous-cutanée doivent être injectés à deux endroits différents.

### Limitations d'emploi

*Contre-indications*

Aucune connue.

### Effets indésirables

Les volumes à injecter chez les chiens de grande taille peuvent provoquer des irritations locales après administration sous-cutanée.

### Interactions

L'administration simultanée de dexaméthasone peut entraîner une diminution de la concentration sérique du praziquantel.

### Remarques particulières

Ne pas administrer aux animaux destinés à la production alimentaire.

Conserver en-dessous de 30°C et à l'abri de la lumière. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 28 jours. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage. Tenir hors de portée des enfants.

### Présentation

Flacon perforable de 10 ml

### Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 54'194 (B)

ATCvet-Code: QP52AA01

Mise à jour de l'information: avril 2007

The logo for Graeub, featuring the word "graesub" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters "g" and "b" are stylized with a thick, curved underline that loops around the bottom of the letters.