

ISADERM[®] ad us. vet.

Kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde

Zusammensetzung:

1 g Gel enthält:

Acidum fusidicum 5 mg

Betamethasonum (ut B. valeras) 1 mg

Conserv.: E 216, E 218

Excip. ad gelatum

Eigenschaften / Wirkungen:

Fusidinsäure ist wirksam gegen Staphylokokken, insbesondere gegen *S. intermedius*, den Haupterreger von Pyodermie beim Hund. Bisher sind keine Kreuzresistenzen bekannt. Fusidinsäure weist zudem ein sehr niedriges Allergisierungspotential auf. Betamethason wirkt entzündungshemmend und lindert den Juckreiz.

Indikationen:

Oberflächen-Pyodermie (z. B. "hot spot"), Intertrigo

Dosierung / Anwendung:

Zweimal täglich auf die erkrankten Hautstellen auftragen, während mindestens 5 Tagen. Nach Abheilung soll 2 Tage lang weiter behandelt werden. Tritt nach 3 Tagen keine Besserung ein, ist die Diagnose zu überprüfen.

Anwendungseinschränkungen:

Kontraindikationen:

- Allergie auf einen der Bestandteile
- Pilzinfektionen
- Tiefe Pyodermie
- Trächtigkeit

Vorsichtsmassnahmen:

Betamethason kann perkutan resorbiert werden und zu einer vorübergehenden Nebennierensuppression führen. Langandauernde Behandlung oder Behandlung grösserer Hautflächen ist deshalb zu vermeiden. Ebenso soll das Ablecken der frisch behandelten Stellen verhindert werden.

Sonstige Hinweise:

- Nur zur äusserlichen Anwendung. Hände nach der Anwendung gut waschen.
- Bei 15-25°C lagern, nicht gefrieren lassen.
- Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit "EXP:" bezeichneten Datum verwendet werden.

Packungen:

Tuben zu 15 g

Swissmedic 54'379 (A)

ATC vet Code QD07CC01

Zulassungsinhaber:

Dr. E. Graeub AG, Bern

Stand der Information: Juni 2003



Dechra