

5. CONTRE-INDICATIONS

Chez les juments gestantes, le traitement par Venti Plus doit être interrompu dès l'apparition de signes annonciateurs d'une mise bas imminente, car le principe actif clenbutérol pourrait influencer le déroulement de la mise bas en inhibant les contractions.

Ne pas utiliser chez les juments allaitantes (produisant du lait), car l'influence éventuelle des substances actives excrétées dans le lait sur le poulain allaité n'a pas été suffisamment établie (voir section 12 «Gestation et lactation»).

Ne pas utiliser en cas d'œdème pulmonaire débutant ou de troubles de la fonction rénale ou hépatique.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un principe actif ou à un autre composant.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Après administration de Venti Plus, une transpiration, des tachycardies et des tremblements musculaires peuvent se produire dans de très rares cas. Chez certains chevaux, des niveaux élevés d'enzyme musculaire CPK ont été mesurés temporairement dans le sérum sanguin dans le cadre de l'essai clinique, mais ces résultats n'étaient pas significatifs. Très rarement, une légère fatigue des chevaux a été observée après administration.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chevaux

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Le dosage est de 0,8 µg de chlorhydrate de clenbutérol et de 0,3 mg de chlorhydrate de dembrexine par kg de poids corporel ((correspondant à 1 g de granulés pour 20 kg de poids corporel) deux fois par jour à 12 h d'intervalle.

La cuillère-mesure jointe au produit correspond à 10 g de granulé,

Par exemple :

Chevaux - 200 kg de poids corporel: 10 g (= 1 mesurette) deux fois par jour

Chevaux - 500 kg de poids corporel: 25 g (= 2,5 mesurettes) deux fois par jour

Durée du traitement

La durée du traitement dépend du type et de la durée de l'affection. En cas de maladies aiguës et subaiguës, un traitement de 10 à 14 jours est généralement suffisant. Le traitement doit en tout cas être poursuivi jusqu'à ce que tous les symptômes cliniques aient entièrement disparu.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les granulés sont à administrer de préférence avec de la nourriture.

10. TEMPS D'ATTENTE

Chevaux

Tissus comestibles : 28 jours

Ne pas utiliser chez les chevaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur l'étiquette

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à Venti Plus devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Gestation et lactation :

Pour les juments gravides, il est recommandé d'interrompre le traitement avec Venti Plus à l'approche de la mise bas, car le clenbutérol inhibe les contractions et pourrait influencer le déroulement de la mise bas.

Utilisation non recommandée durant la lactation (production de lait), car il n'a pas été possible de déterminer avec suffisamment de certitude l'effet sur le poulain des principes actifs excrétés dans le lait.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Différents médicaments administrés simultanément peuvent entraîner des propriétés modifiées du principe actif clenbutérol contenu dans le médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Un surdosage allant jusqu'à un facteur 8 de la substance active clenbutérol contenue dans le médicament vétérinaire ne provoque que des effets indésirables passagers tels qu'une transpiration, des palpitations cardiaques et des tremblements musculaires légers. En cas de surdosage encore plus important, un bêta-bloquant (p. ex. propranolol) peut être administré comme antidote. Même en cas de surdosage d'un facteur 15 de la substance active dembrexine contenue dans le médicament vétérinaire, aucun effet indésirable n'a été observé.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

19.07.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dose de granulé, 500 g avec cuillère-mesure

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 54737

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.