

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Selgian 4 mg ad us. vet., teilbare Filmtabletten für Hunde
Selgian 10 mg ad us. vet., teilbare Filmtabletten für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: CEVA SANTE ANIMALE, Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Frankreich.

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Selgian 4 mg ad us. vet., teilbare Filmtabletten für Hunde.

Selgian 10 mg ad us. vet., teilbare Filmtabletten für Hunde.

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Selegilinhydrochlorid 4 mg (entsprechend 3.35 mg Selegilin)

Selegilinhydrochlorid 10 mg (entsprechend 8.37 mg Selegilin)

Weisse Filmtablette mit Kreuzrille auf einer Seite.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Hunden mit Verhaltensstörungen emotionalen Ursprungs in Verbindung mit einer Verhaltenstherapie.

5. GEGENANZEIGEN

Auf Grund seiner Eigenschaften kann das Selegilin auf die Sekretion von Prolaktin wirken. Deshalb wird von einer Verabreichung des Tierarzneimittels an trächtige und säugende Hündinnen abgeraten. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte) wurden Erbrechen, Speichelfluss, Durchfall und/oder Zittern beobachtet.

Versuche haben gezeigt, dass einige dominante Hunde mit Verhaltensstörungen, aber ohne Anzeichen von Aggression, nach der Behandlung aggressiv werden können. Bei Hunden, die bereits vorher Aggressionen zeigten, kann sich diese verstärken. In solchen Fällen ist ein angemessenes Training unerlässlich.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Verabreichung: Morgens Tabletten ins Maul des nüchternen Hundes geben.

0.5 mg Selegilinhydrochlorid/kg/Tag in einer Verabreichung.

Anzahl Tabletten je nach Körpergewicht:

Selgian 4 mg:

Gewicht des Hundes in kg		Anzahl Tabletten
1.5	< 3	¼
3	< 5	½
5	< 7	¾
7	< 9	1
9	< 11	1 ¼
11	< 13	1 ½
13	< 15	1 ¾
15	< 17	2

Selgian 10 mg:

Gewicht des Hundes in kg		Anzahl Tabletten
8	< 12	½
12	< 17	¾
17	< 22	1
22	< 27	1 ¼
27	< 32	1 ½
32	< 37	1 ¾
37	< 42	2

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Mindestdauer der Behandlung beträgt 2 Monate. Sie ist bis zur Stabilisierung des Zustands fortzusetzen.

Die Behandlung ist nicht allmählich abzusetzen, sondern muss brüsk abgebrochen werden.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Raumtemperatur lagern (15°C- 25°C).

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Die geteilten und nicht verwendeten Teile der Tabletten sind maximal während 4 Tagen in der Verpackung aufzubewahren

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Die Verwendung einer geringeren als der empfohlenen Dosierung kann im Falle eines verdeckten Hierarchiekonflikts zu einer Verschärfung der Aggressivität des Hundes führen. Stellt sich nach 2 Monaten keine Besserung ein, ist von einer Fortsetzung der Behandlung abzusehen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Emotionale Störungen können bei Hunden ursächlich verschieden bedingt sein. Hinter emotionalen Störungen können sich beispielsweise haltungsbedingte, aber auch hierarchische Störungen verbergen. So kann im Falle eines dominanten Hundes, der an emotionalen Störungen leidet, das durch die medikamentöse Behandlung herbeigeführte Verschwinden der Störungen, eine versteckte Aggressivität des Hundes zum Vorschein bringen. In diesem Fall ist daher die medikamentöse Behandlung unbedingt durch eine begleitende Verhaltenstherapie zu ergänzen.

Trächtigkeit und Laktation:

Wegen fehlender spezifischer Studien wird von einer Verabreichung des Präparates an trächtige und säugende Hündinnen abgeraten.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Die Verabreichung vom Wirkstoff Selegilin in Selgian über ein Jahr in der 2-fachen Dosis, die für Hunde empfohlen wird, hat keine Nebenwirkungen hervorgerufen.

Die Verabreichung des Produkts über einen Zeitraum von drei Monaten in einer Dosis, die dem 5-fachen der empfohlenen Dosis entspricht, wird gut vertragen; mit Ausnahme von Erbrechen und Speicheln, die sporadisch bei einigen wenigen Hunden beobachtet wurden und als erste Überdosierungssymptome angesehen werden können.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 11.09.2024

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Selgian 4 mg : Schachtel mit 30 Tabletten.

Selgian 10 mg: Schachtel mit 30 oder 100 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 54'775

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.