

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Selgian 4 mg ad us. vet., comprimés pelliculés sécables pour chiens
Selgian 10 mg ad us. vet., comprimés pelliculés sécables pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

Fabricant responsable de la libération des lots : CEVA SANTE ANIMALE, Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Selgian 4 mg ad us. vet., comprimés pelliculés sécables pour chiens

Selgian 10 mg ad us. vet., comprimés pelliculés sécables pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active :

Chlorhydrate de sélégiline 4 mg (correspondant à 3.35 mg de sélégiline)

Chlorhydrate de sélégiline 10mg (correspondant à 8.37 mg de sélégiline)

Comprimé pelliculé blanc avec lignes de sécabilité en croix sur une face.

4 INDICATION(S)

Pour le traitement des chiens présentant des troubles du comportement d'origine émotionnelle en association avec une thérapie comportementale.

5 CONTRE-INDICATIONS

En raison de ses propriétés, la sélégiline peut agir sur la sécrétion de prolactine.

C'est pourquoi il est recommandé de ne pas administrer le produit aux chiennes gestantes et allaitantes

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun signalé à ce jour.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration : Administrer le matin à jeun en plaçant le comprimé dans la gueule du chien.

0,5 mg de chlorhydrate de sélégiline/kg/jour en une administration.

Nombre de comprimés à administrer en fonction du poids :

Selgian 4:

Poids du chien en kg		Nombre de comprimés
1.5	< 3	$\frac{1}{4}$
3	< 5	$\frac{1}{2}$
5	< 7	$\frac{3}{4}$
7	< 9	1
9	< 11	1 $\frac{1}{4}$
11	< 13	1 $\frac{1}{2}$
13	< 15	1 $\frac{3}{4}$
15	< 17	2

Selgian 10:

Poids du chien en kg		Nombre de comprimés
8	< 12	$\frac{1}{2}$
12	< 17	$\frac{3}{4}$
17	< 22	1
22	< 27	1 $\frac{1}{4}$
27	< 32	1 $\frac{1}{2}$
32	< 37	1 $\frac{3}{4}$
37	< 42	2

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

La durée minimale du traitement est de 2 mois. Il doit être maintenu jusqu'à stabilisation de l'état. Le traitement ne doit pas être interrompu progressivement, mais brutalement.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Les portions non-utilisées des comprimés sont à conserver au maximum 4 jours dans l'emballage

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible : L'utilisation d'une posologie inférieure à la posologie préconisée peut exacerber l'agressivité en cas de conflit hiérarchique latent.

Si aucune amélioration clinique n'est observée au bout de 2 mois, il est inutile de poursuivre le traitement.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal : Les perturbations émotionnelles des chiens peuvent avoir des origines diverses. Leurs conditions de vie ou des problèmes hiérarchiques peuvent en être la cause. Ainsi, dans le cas d'un chien dominant qui présente des troubles émotionnels, la suppression des troubles par un traitement médicamenteux peut faire apparaître une agressivité cachée. Dans un tel cas, le traitement médicamenteux doit, par conséquent, absolument être complété par une thérapie du comportement.

Gestation et lactation : À défaut d'études spécifiques, il est recommandé de ne pas administrer la préparation aux chiennes gestantes et allaitantes.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) : L'administration de principe actif de Selgian, la sélégiline, pendant un an à 2 fois la dose recommandée chez le chien n'a pas provoqué d'effets secondaires.

Aucun effet n'a été noté lors de l'administration de la spécialité à 5 fois la dose adaptée pendant trois mois, à l'exception de vomissements et d'hypersalivation observés sporadiquement chez quelques chiens. Ces signes peuvent être considérés comme les premiers symptômes d'un surdosage.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

22.11.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

SELGIAN 4 : Etui de 30 comprimés.

SELGIAN 10 : Etui de 30 ou 100 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 54'775

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.