

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.swissmedicinfo-pro.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Selgian 4 mg ad us. vet., compresse rivestite con film divisibili per cani
Selgian 10 mg ad us. vet., compresse rivestite con film divisibili per cani

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE

Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Selgian 4 mg ad us. vet., compresse rivestite con film divisibili per cani.

Selgian 10 mg ad us. vet., compresse rivestite con film divisibili per cani.

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Selegilina cloridrato 4 mg (equivalenti a 3,35 mg di selegilina)

Selegilina cloridrato 10 mg (equivalenti a 8,37 mg di selegilina)

Compressa rivestita di un film di colore bianco con linee di frattura trasversali su un lato.

4 INDICAZIONE(I)

Per il trattamento di cani con turbe comportamentali di origine emozionale in associazione a terapia comportamentale.

5 CONTROINDICAZIONI

Per le sue proprietà, la selegilina può avere un effetto sulla secrezione di prolattina. Pertanto la somministrazione del medicamento veterinario alle cagne in gravidanza e in allattamento non è consigliata. Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a un eccipiente.

6 EFFETTI COLLATERALI

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate) sono stati osservati vomito, salivazione, diarrea e/o tremori.

Gli studi hanno dimostrato che alcuni cani dominanti con problemi comportamentali ma senza segni di aggressività, possono diventare aggressivi dopo il trattamento. Nei cani che già manifestano aggressività, questa può intensificarsi. In questi casi, è essenziale un addestramento adeguato.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani.



8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione: al mattino a digiuno ponendo le compresse in bocca al cane.

0,5 mg di selegilina cloridrato/kg al giorno in un'unica somministrazione.

Numero di compresse in base al peso corporeo:

Selgian 4 mg:

Peso del cane in kg	Numero di compresse
1,5 <3	¼
3 <5	½
5 <7	¾
7 <9	1
9 <11	1¼
11 <13	1½
13 <15	1¾
15 <17	2

Selgian 10 mg:

Peso del cane in kg	Numero di compresse
8 <12	½
12 <17	¾
17 <22	1
22 <27	1¼
27 <32	1½
32 <37	1¾
37 <42	2

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La durata minima del trattamento è di 2 mesi. Il trattamento deve essere continuato fino a stabilizzazione della condizione dell'animale.

Il trattamento non deve essere sospeso gradualmente bensì interrotto bruscamente.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Le parti di compressa divise e non utilizzate devono essere conservate nella confezione per un massimo di 4 giorni.

12 AVVERTENZE SPECIALI



Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

L'utilizzo di un dosaggio inferiore a quello raccomandato può accentuare l'aggressività del cane in caso di conflitto gerarchico latente. Se dopo 2 mesi non si riscontrano miglioramenti, si deve interrompere il trattamento.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

I disturbi emozionali nei cani possono avere cause diverse. Dietro a un disturbo emozionale possono celarsi, ad esempio, turbe comportamentali ma anche conflitti gerarchici. Pertanto, nel caso di un cane dominante che soffre di disturbi emozionali, la scomparsa delle turbe indotta dal trattamento farmacologico può far emergere un'aggressività latente. In questo caso il trattamento farmacologico deve essere assolutamente integrato e accompagnato da una terapia comportamentale.

Gravidanza e allattamento:

Dal momento che non sono stati condotti studi specifici, la somministrazione del preparato a cagne in gravidanza e in allattamento non è consigliata.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

La somministrazione del principio attivo selegilina contenuto in Selgian per un periodo di un anno, in dose doppia a quella raccomandata per i cani, non ha causato effetti collaterali.

La somministrazione del prodotto per un periodo di tre mesi a una dose corrispondente a 5 volte la dose raccomandata è ben tollerata, ad eccezione di vomito e salivazione, che sono stati osservati sporadicamente in un numero esiguo di cani e possono essere considerati i primi sintomi di sovradosaggio.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali veterinari non utilizzati e i rifiuti derivati da tale medicamento veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

11.09.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.swissmedicinopro.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Selgian 4 mg: Scatola da 30 compresse.

Selgian 10 mg: Scatola da 30 o 100 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 54775

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.

