

**Cyclospray® ad us. vet.**

## **Antibiotikum-Spray für Rinder, Schafe und Schweine**

### **Zusammensetzung**

Chlortetracyclini Hydrochloridum 3.21 g (corr. Chlortetracyclinum 7.3 % m/m);  
Color.: E131; Excip. ad susp., Propellentia ad aerosolum pro vase 211 ml

### **Eigenschaften/Wirkungen**

Chlortetracyclin wirkt bakteriostatisch durch Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese. Dadurch werden lebenswichtige Funktionen der Bakterien gestört.

### **Pharmakokinetik**

Nach Anwendung von Chlortetracyclinspray auf der Haut kommt es zu einer vernachlässigbaren Resorption des Wirkstoffes. Deshalb wirkt Cyclospray nur lokal; eine systemische Wirkung oder unerwünschte Nebenwirkungen treten nicht auf.

### **Indikationen**

Unterstützung der Behandlung von oberflächlichen Haut- und Klaueninfektionen, interdigitaler Dermatitis (Klauenfäule beim Rind, Moderhinke beim Schaf) und digitaler Dermatitis, verursacht durch Chlortetracyclin empfindliche Keime wie z.B. *Arcanobacterium pyogenes*, *Dichelobacter nodosus* und *Fusobacterium necrophorum*. Vorbeugung von Infektionen bei oberflächlichen traumatischen Wunden.

### **Dosierung/Anwendung**

Cyclospray soll ausschliesslich auf der Haut angewendet werden. Aus einer Distanz von 15-20 cm die zu behandelnde Fläche während ca. 3 Sek. besprühen, bis die Fläche deutlich gefärbt erscheint. Bei Klauenbehandlungen den Vorgang nach 30 Sek. wiederholen. Behandlung von digitaler Dermatitis: An drei aufeinanderfolgenden Tagen, ein- bis zweimal täglich. Behandlung anderer Klaueninfektionen: Ein- bis zweimal täglich. Abhängig von Schweregrad und Heilungsverlauf ein bis drei Tage anwenden. Vorbeugung von Infektionen nach Verletzungen: Einmalige Anwendung.

### **Anwendungseinschränkungen/Kontraindikationen**

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclinen.

### **Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Anwendung im Kopfbereich Augen schützen. Bei laktierenden Rindern/Schafen nicht in der Nähe von Euter/Zitzen anwenden. Nötigenfalls Euter abdecken.

### **Unerwünschte Wirkungen**

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Produkt können auftreten.

### **Absetzfristen**

Keine.

### **Wechselwirkungen**

Keine bekannt.

### **Sonstige Hinweise**

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei der Anwendung Handschuhe tragen und Augen und Gesicht schützen.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit „Exp.“ bezeichneten Datum verwendet werden.

### **Packungen**

Spraydose 211 ml, Spraydose mit zusätzlichem Ventil-Düsensystem 211 ml

### **Herstellung**

Eurovet Animal Health BV  
Bladel, Niederlande/Pays-Bas

### **Zulassungsinhaberin**

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic Nr. 55'647 (A)  
ATC vet code: QD06AA02

Stand der Information  
März 2017