

## **Cyclospray® ad us. vet.**

### **Spray antibiotique pour bovins, moutons et porcs**

#### **Composition**

Chlortetracyclini Hydrochloridum 3.21 g (corr. Chlortetracyclinum 7.3 % m/m);  
Color.: E131; Excip. ad susp., Propellentia ad aerosolum pro vase 211 ml

#### **Propriétés/effets**

En inhibant la synthèse protéique, la chlortétracycline a une action bactériostatique. Ainsi les fonctions vitales des bactéries sont perturbées.

#### **Pharmacocinétique**

Après application sur la peau, la substance active est résorbée en quantité négligeable. Ainsi Cyclospray agit seulement localement, sans apparition d'effets systémiques ou d'effets secondaires indésirables.

#### **Indications**

Traitement de soutien des infections superficielles de la peau et des onglons, dermatites interdigitales (pourriture des onglons chez les bovins, piétin chez les moutons), dermatites digitales dues à des germes sensibles à la chlortétracycline comme p. ex. *Arcanobacterium pyogenes*, *Dichelobacter nodosus* et *Fusobacterium necrophorum*.  
Prévention des infections des plaies superficielles traumatiques.

#### **Posologie/mode d'emploi**

Appliquer Cyclospray uniquement sur la peau. Vaporiser la zone à traiter durant 3 sec. à une distance de 15-20 cm jusqu'à coloration nette de la surface. Lors du traitement des onglons, répéter l'application après 30 sec. Traitement de dermatites digitales : appliquer une à deux fois par jour pendant 3 jours consécutifs. Traitement des autres infections d'onglons : appliquer une à deux fois par jour. En fonction de la gravité et de la vitesse de guérison répéter le traitement pendant un à trois jours. Prévention des infections suite à des blessures: administration unique.

#### **Limitations d'emploi/contre-indications**

Hypersensibilité connue envers les tétracyclines.

#### **Précautions**

Protéger les yeux lors de traitements au niveau de la tête. Chez les vaches / brebis allaitantes ne pas utiliser à proximité de la mamelle / des trayons. Au besoin couvrir la mamelle.

#### **Effets indésirables**

Des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire.

#### **Délais d'attente**

Aucun.

#### **Interactions**

Aucune.

**Remarques particulières**

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants lors de l'application et protéger les yeux et le visage. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir hors de la portée des enfants. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date indiquée avec „Exp.“ sur le récipient.

**Présentations**

Bombe aérosol de 211 ml, bombe aérosol de 211 ml avec buse de pulvérisation à clapet.

**Fabrication**

Eurovet Animal Health BV  
Bladel, Niederlande/Pays-Bas

**Titulaire de l'autorisation**

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic Nr. 55'647 (A)  
ATC vet code: QD06AA02

Mise à jour de l'information  
mars 2017