

Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

Packungsbeilage

Cyclospray ad us. vet., Spray für Rinder, Schafe und Schweine

1. Name und Anschrift der Zulassungsinhaberin und, wenn unterschiedlich, der Herstellerin, die für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaberin: Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Niederlande

ODER

IGS Aerosols GmbH, Im Hemmet 1 und 2, 79664 Wehr, Deutschland

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Cyclospray ad us. vet., Spray für Rinder, Schafe und Schweine

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 Spraydose zu 200 ml enthält:

Wirkstoff:

Chlortetracyclinhydrochlorid 3.21 g

(entsp. Chlortetracyclin 2.98 g)

Sonstiger Bestandteil:

Patentblau V (E131) 0.196 g

Spray zur äusserlichen Anwendung, blaue Suspension

4. Anwendungsgebiete

Antibiotikum-Spray für Rinder, Schafe und Schweine

Unterstützung der Behandlung von oberflächlichen Haut- und Klaueninfektionen, interdigitaler Dermatitis (Klauenfäule beim Rind, Moderhinke beim Schaf) und digitaler Dermatitis, verursacht durch Chlortetracyclin empfindliche Keime.

Vorbeugung von Infektionen bei oberflächlichen traumatischen Wunden.

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclinen oder einem sonstigen Bestandteil.

6. Nebenwirkungen

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Produkt können auftreten.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. Zieltierarten

Rind, Schaf und Schwein

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Cyclospray soll ausschliesslich auf der Haut angewendet werden. Aus einer Distanz von 15 - 20 cm die zu behandelnde Fläche während ca. 3 Sek. besprühen, bis die Fläche deutlich gefärbt erscheint. Bei Klauenbehandlungen den Vorgang nach 30 Sek. wiederholen.

Behandlung von digitaler Dermatitis: an drei aufeinanderfolgenden Tagen, ein- bis zweimal täglich.

Behandlung anderer Klaueninfektionen: ein- bis zweimal täglich. Abhängig von Schweregrad und Heilungsverlauf ein bis drei Tage anwenden.

Vorbeugung von Infektionen nach Verletzungen: einmalige Anwendung.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine

10. Wartezeiten

Keine

11. Besondere Lagerungshinweise

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei Anwendung im Kopfbereich Augen schützen. Bei laktierenden Tieren, deren Milch für die Lebensmittelgewinnung verwendet wird, nicht in der Nähe von Euter/Zitzen anwenden. Nötigenfalls Euter abdecken.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Sprühnebel nicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei der Anwendung Handschuhe tragen und Augen und Gesicht schützen. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Extrem entzündbares Aerosol.

Trächtigkeit und Laktation:

Tierarzneimittel ist für die Anwendung während der Trächtigkeit oder Laktation sicher (s. Warnhinweis bezüglich Anwendung an Euter/Zitzen).

13. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

28.10.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. Weitere Angaben

Spraydose 200 ml

Spraydose mit zusätzlichem Ventil-Düsensystem 200 ml

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 55'647

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.