

ESCONARKON AD US. VET., Injektionslösung

Euthanasie von Pferden, Rindern, Hunden, Katzen, Kaninchen und Nagetieren

Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff: Pentobarbitalum natricum 300 mg

Hilfsstoffe: Color.: E 123, Ethanolum 96 per centum, Aqua ad injectabilia

Eigenschaften/Wirkungen

Die intravenöse oder intraperitoneale Injektion von Pentobarbital ist eine schmerzlose und sichere Methode zur Euthanasie von Gross- und Kleintieren. Die Tiere fallen schnell in einen tiefen Schlaf, der bei Warmblütern rasch, schmerz- und reflexlos und ohne Exzitationen in den Tod durch Herz- und Atemstillstand übergeht. Bei wechselwarmen Tieren tritt der Tod, je nach Resorptions- und Stoffwechselfgeschwindigkeit, mehr oder weniger verzögert ein.

Indikationen

Euthanasie von Tieren.

Dosierung/Anwendung

Esconarkon wird vorzugsweise rasch intravenös verabreicht. Eine schnelle, schmerzlose und sichere Wirkung ist aber auch bei einmaliger intraperitonealer Injektion gewährleistet, sofern die intravenöse Anwendung nicht möglich ist.

Dosierungsempfehlungen:

Intravenös:

Hund:	90–150 mg/kg Körpergewicht	(0,3–0,5 ml/kg)
Katze:	120–180 mg/kg Körpergewicht	(0,4–0,6 ml/kg)
Rind:	30–150 mg/kg Körpergewicht	(0,1–0,5 ml/kg)
Pferd:	90 mg/kg Körpergewicht	(0,3 ml/kg)
Kaninchen und Nagetiere:	150–300 mg/kg Körpergewicht	(0,5–1 ml/kg)

Intraperitoneal:

Hund:	300–450 mg/kg Körpergewicht	(1–1,5 ml/kg)
Katze:	300–450 mg/kg Körpergewicht	(1–1,5 ml/kg)
Kaninchen und Nagetiere:	300–600 mg/kg Körpergewicht	(1–2 ml/kg)
Vögel:	300–600 mg/kg Körpergewicht	(1–2 ml/kg)

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen:

Nicht für Narkosezwecke verwenden.

Vorsichtsmassnahmen:

Es wird empfohlen, Pferde auf Grund der höheren Exzitationsneigung vorher zu sedieren sowie Esconarkon über einen Venenkatheter zu applizieren.

Unerwünschte Wirkungen

Gelegentlich können Abwehrbewegungen und Unruhe auftreten.

Absetzfristen

Nicht bei Tieren einsetzen, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Wechselwirkungen

Keine.

Sonstige Hinweise

Bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufbewahren.

Nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» angegebenen Datum verwenden.

Aufbrauchsfrist nach erster Entnahme: 4 Wochen.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Tiere, die mit Esconarkon euthanasiert wurden, dürfen nicht mehr als Tierfutter verwendet werden.

ATCvet-Code: QN51AA01

Packungen

Flaschen zu 100 ml und 500 ml

Swissmedic 55815 (B)

Streuli Tiergesundheit AG, 8730 Uznach

Stand der Information: Juli 2008