

ESCONARKON AD US. VET., Solution injectable

Euthanasie des cheveaux, bovins, chiens, chats, lapins et rongeurs

Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

Composition

1ml solution d'injections contient:

Principe actif: Pentobarbitalum natricum 300 mg

Excipients: Color.: E 123, Ethanolum 96 per centum, Aqua ad injectabilia

Propriétés/Effets

L'injection intraveineuse ou intrapéritonéale de pentobarbital est une méthode indolore et sûre, pour l'euthanasie des animaux de toutes tailles. Les animaux sombrent rapidement dans un sommeil profond qui, chez les animaux à sang chaud, entraîne vite, sans douleur, sans réflexes et sans excitation la mort par arrêt du cœur et apnée. Chez les animaux poïkilothermes, la mort intervient plus au moins rapidement, selon la vitesse de résorption et du métabolisme.

Indications

Euthanasie des animaux.

Posologie/Mode d'emploi

Esconarkon est administré de préférence en injection intraveineuse. Un effet rapide, indolore et sûr est également obtenu par injection intrapéritonéale si l'application par voie intraveineuse s'avère impossible.

Posologie recommandée: Intraveineuse:

Chien: 90–150 mg/kg poids corporel (0,3–0,5 ml/kg)

Chat: 120–180 mg/kg poids corporel (0,4–0,6 ml/kg)

Bovin: 30–150 mg/kg poids corporel (0,1–0,5 ml/kg)

Cheval: 90 mg/kg poids corporel (0,3 ml/kg) Lapin et rongeurs:

150–300 mg/kg poids corporel (0,5–1 ml/kg)

Intrapéritonéale:

Chien: 300–450 mg/kg poids corporel (1–1,5 ml/kg)

Chat: 300–450 mg/kg poids corporel (1–1,5 ml/kg) Lapin et rongeurs: 300–

600 mg/kg poids corporel (1–2 ml/kg) Oiseaux: 300–600 mg/kg poids corporel (1–2

ml/kg)

Limitations d'emploi

Contre-indications:

Ne pas utiliser comme anesthésique.

Précautions:

Chez le cheval, dû à son haut degré d'excitation, il est recommandé de le calmer avant, ainsi que, de l'administrer Esconarkon par un cathéter veineux.

Effets indésirables

Occasionnellement, des signes de résistance et d'agitation peuvent apparaître.

Délais d'attente

Ne pas appliquer aux animaux comestibles.

Interactions

Aucune.

Remarques particulières

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Le médicament ne peut pas être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention «EXP».

Délai d'utilisation après le premier prélèvement: 4 semaines. Tenir hors de portée

des enfants.

Les animaux euthanasiés au moyen d'Esconarkon ne doivent pas être utilisés comme nourriture pour d'autres animaux.

Code ATCvet: QN51AA01

Présentation

Flacons de 100 ml et 500 ml

Swissmedic 55815 (B)

Streuli Tiergesundheits SA, 8730 Uznach

Mise à jour de l'information: juillet 2008