

Incontex® ad us. vet.

Pour le traitement de l'incontinence urinaire chez le chien

Composition

1 ml de sirop contient:

Phénylpropanolamini hydrochloridum 25.00 mg

(corresp. Phénylpropanolaminum 20.14 mg)

Aromatica: Saccharinum et alia, Color.: E 150

Excip. ad solut.

Propriétés / Effets

La phénylpropanolamine, un agoniste α -adrénergique, possède des effets sympathomimétiques directs par liaison aux récepteurs $\alpha 1$ -adrénergiques et indirects par libération et inhibition de la réabsorption de noradrénaline dans la fessure synaptique. La phénylpropanolamine entraîne la constriction de la musculature lisse dans divers tissus, ce qui provoque, entre autres, une augmentation de la pression urétrale au niveau de la vessie. Cet effet peut être utilisé pour le traitement de l'incontinence urinaire.

Au début du traitement, l'effet α -adrénergique peut provoquer une tachycardie et une élévation de la pression artérielle. Cependant, lors de la prolongation du traitement, on constate plutôt l'effet contraire (tachyphylaxie) en raison de l'épuisement du réservoir de noradrénaline.

Pharmacocinétique

Lors de l'administration orale, la phénylpropanolamine est pratiquement complètement résorbée. Une concentration sérique efficace est atteinte après 2 heures et peut être maintenue durant toute la journée avec deux administrations quotidiennes. La phénylpropanolamine est éliminée principalement sous forme inchangée par voie urinaire.

Indications

Incontinence urinaire chez le chien lors d'insuffisance urétrale de la fermeture vésicale

Posologie / Mode d'emploi

1.5 mg/kg PC deux fois par jour.

La seringue graduée jointe est étalonnée comme suit:

Quantité Incontex (ml):	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Poids corporel (kg):	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

Enlever la gaine protectrice, puis visser la seringue graduée sur la bouteille à l'aide du bouchon-raccord. En tirant le piston, la quantité d'Incontex nécessaire peut être prélevée et mélangée à la nourriture.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Incontex ne doit pas être administré aux animaux souffrant d'arythmie cardiaque, d'hypertonie, d'affections rénales ou de glaucome.

Ne pas administrer aux animaux en gestation ou en lactation.

Précautions

En raison des effets cardiovasculaires sympathomimétiques, le patient doit être examiné périodiquement sur la présence éventuelle d'effets secondaires. Bien instruire le propriétaire sur le dosage du produit.

Effets indésirables

Des excitations, de la léthargie et de l'anorexie peuvent apparaître.

Dans de rares cas, une légère érection des poils de la nuque a été constatée.

Interactions

Ne pas administrer d'autres médicaments ayant un effet sympathomimétique durant le traitement avec Incontex.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15 - 25°C) et à l'abri de la lumière. La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 3 mois.

Présentation

Bouteille de 150 ml avec seringue graduée

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 55'854(B)
ATCvet-Code: QG04BX91

Mise à jour de l'information: janvier 2007

