

**Informazione per i detentori di animali**Informazione professionale per il personale medico vedi [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)**Foglietto illustrativo  
Incontex® ad us. vet., sciroppo per cani****1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti**

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

**2. Denominazione del medicamento veterinario**

Incontex ad us. vet., sciroppo per cani

Fenilpropanolamina cloridrato

**3. Principi attivi ed altri ingredienti**

1 ml contiene:

**Principio attivo:**

Fenilpropanolamina cloridrato 25.00 mg

(equivalente a fenilpropanolamina 20.14 mg)

Sciroppo

Soluzione chiara di colore marrone-rossastro

**4. Indicazioni**

Per il trattamento della debolezza vescicale nei cani causata da una chiusura inadeguata dell'orifizio vescicale

**5. Controindicazioni**

Incontex non deve essere usato in animali con disturbi del ritmo cardiaco, ipertensione, problemi renali o glaucoma.

Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

**6. Reazioni avverse**

Possono verificarsi ipereccitabilità, indolenza, anoressia, diarrea, vomito, aritmia cardiaca e debolezza circolatoria.

In alcuni casi, è stato osservato un lieve grado di arruffamento dei peli sulla nuca.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

**7. Specie di destinazione**

Cane

**8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione**

1.5 mg di principio attivo fenilpropanolamina cloridrato per kg di peso corporeo due volte al giorno.

Da somministrare con il cibo.

**9. Avvertenze per una corretta somministrazione**

La pompetta dosatrice in dotazione è calibrata come segue:

Peso corporeo (kg)	Quantità di Incontex (ml)	Peso corporeo (kg)	Quantità di Incontex (ml)
8	0.5	48	3
16	1	56	3.5
24	1.5	64	4
32	2	72	4.5
40	2.5	80	5

Per l'uso, staccare la pompetta dosatrice insieme al tappo a vite dal coperchio di protezione e avvitare sul flacone. Tirando lo stantuffo, estrarre la quantità necessaria di Incontex e mescolarla al cibo.

**10. Tempi di attesa**

Non pertinente

### **11. Particolari precauzioni per la conservazione**

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

### **12. Avvertenze speciali**

#### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Incontex non è adatto al trattamento dell'orinazione inappropriata causata da un disturbo comportamentale.

Nelle cagne sotto l'anno di età, prima del trattamento il veterinario dovrebbe considerare la possibilità di una malformazione come causa dell'incontinenza urinaria.

#### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

A causa degli effetti sul cuore e sui vasi sanguigni, il paziente deve essere esaminato regolarmente dal veterinario per eventuali effetti collaterali. Il proprietario deve essere adeguatamente istruito dal veterinario sul dosaggio del prodotto.

#### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Un sovradosaggio elevato è potenzialmente letale, soprattutto nei bambini.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con il prodotto, lavare accuratamente con acqua e sapone. Lavarsi le mani dopo l'uso.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 15 minuti.

#### Gravidanza ed allattamento

Non somministrare ad animali in gravidanza o in allattamento.

#### Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Somministrare altri medicinali solo dopo aver consultato il veterinario. Non somministrare altri medicinali che causano eccitazione del sistema nervoso simpatico.

#### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

### **13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

28.12.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15. Altre informazioni**

Flacone di vetro di color ambra da 150 ml con pompetta dosatrice in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 55'854

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.