

## INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.swissmedicinfo-pro.ch](http://www.swissmedicinfo-pro.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

#### 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE

MSD Animal Health Srl, Bürgenstrasse 8, 6005 Lucerna

#### 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

#### 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 collare medicato contiene:

##### **Principio attivo:**

Per cani di taglia piccola e media (48 cm, 19 g):

Deltamethrinum 0.760 g

Per cani di taglia grande (65 cm, 25 g):

Deltamethrinum 1.0 g

Collare medicato bianco in materiale flessibile con una fibbia di plastica a un'estremità

#### 4 INDICAZIONE(I)

Prevenzione dalle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 4 mesi.

Prevenzione dalle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) per 6 mesi.

Prevenzione dalla puntura di flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) per un periodo di 5 – 6 mesi. I flebotomi sono i vettori della Leishmania e la trasmettono succhiando il sangue.

Prevenzione dalla puntura delle zanzare (*Culex pipiens pipiens*) per un periodo di 6 mesi.

#### 5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su cuccioli di età inferiore alle 7 settimane.

Non utilizzare su cani con lesioni cutanee estese.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a un eccipiente.

##### **Non utilizzare su gatti.**

La deltametrina è estremamente tossica per i gatti. Scalibor® non può in nessun caso essere utilizzato nei gatti. Possono manifestarsi sintomi di avvelenamento particolarmente pericolosi, che possono sfociare in forti crampi muscolari e disturbi della motilità, portando anche alla morte del gatto.

#### 6 EFFETTI COLLATERALI

In rari casi le reazioni di ipersensibilità possono causare alterazioni cutanee locali, eritemi, prurito e perdita del pelo.

Estremamente rara è invece la possibilità di sintomi neurologici come il tremito e l'apatia. In questi casi il collare deve essere rimosso. I sintomi scompaiono nell'arco delle 48 ore seguenti. Se i sintomi persistono, consultare la veterinaria/il veterinario. Un'eventuale cura sintomatica mediante diazepam può essere intrapresa.



Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

## 7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

## 8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, MODALITÀ E DURATA DI SOMMINISTRAZIONE

Per applicazione esterna. Utilizzare un solo collare per soggetto. Il collare può essere utilizzato dall'età di 7 settimane.

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il collare viene estratto dall'involucro protettivo sigillato e posto attorno al collo dell'animale senza stringerlo. Tra il collare e il collo del cane dovrebbe essere lasciato uno spazio di circa due dita. Fissare il collare con l'apposita fibbia e tagliarlo lasciando 5 cm in eccedenza.

Il collare raggiunge il suo massimo effetto dopo una settimana e dovrebbe quindi essere applicato almeno una settimana prima che l'animale venga introdotto in una zona a rischio di contagio.

Durante i primi 5 giorni dopo la posa del collare, è consigliabile non lasciar fare il bagno al cane.

Il collare mantiene il suo effetto per la durata di 4 mesi (pulci), fino a 6 mesi (zecche, flebotomi, zanzare).

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

## 12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Oltre alla cura del singolo animale, è consigliabile effettuare un trattamento anti-pulci dell'ambiente circostante con mezzi idonei.

In casi rari può accadere durante il periodo di applicazione del collare di osservare la presenza di zecche.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il contatto occasionale con l'acqua non pregiudica l'efficacia del collare, ma esso dovrebbe comunque essere tolto prima di ogni bagno dal momento che il principio attivo è tossico per i pesci ed altri organismi acquatici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Il medicamento è da tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini piccoli tocchino il collare, ci giochino o lo mettano in bocca.

Dopo la manipolazione del collare, lavarsi le mani con acqua fredda e sapone.

Gravidanza e allattamento:

Scalibor® Protectorband può essere utilizzato in cagne in gravidanza e in allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non somministrare contemporaneamente ad altri antiparassitari contenenti organofosfati.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):



In caso di ingestione accidentale del collare da parte del cane, possono verificarsi i seguenti sintomi: scoordinamento dei movimenti, tremore, salivazione, vomito e rigidità degli arti posteriori. Tali sintomi scompaiono nelle successive 48 ore. Se i sintomi persistono, consultare la veterinaria/il veterinario. In caso di bisogno si può usare diazepam quale terapia sintomatica.

**13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  
NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

11.03.2025

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.swissmedicinopro.ch](http://www.swissmedicinopro.ch).

**15 ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni di Scalibor® Protectorband ad us. vet., 48 cm e 65 cm: astucci da 1 o 6 collari medicati  
Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 55995

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.

