

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione: MSD Animal Health GmbH, Werftstrasse 4, 6005 Lucerna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Intervet Productions, Rue de Lyons, F-27460 Igoville

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia piccola e media

Scalibor® Protectorband ad us. vet., collare medicato per cani di taglia grande

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 collare medicato contiene:

Principio attivo:

Per cani di taglia piccola e media (48 cm, 19 g):

Deltamethrinum 0.760 g

Per cani di taglia grande (65 cm, 25 g):

Deltamethrinum 1.0 g

Collare medicato bianco in materiale flessibile con una fibbia di plastica a un'estremità

4. INDICAZIONE(I)

Prevenzione dalle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 4 mesi.

Prevenzione dalle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) per 6 mesi.

Prevenzione dalla puntura di flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) per un periodo di 5 – 6 mesi. I flebotomi sono i vettori della Leishmania e la trasmettono succhiando il sangue.

Prevenzione dalla puntura delle zanzare (*Culex pipiens pipiens*) per un periodo di 6 mesi.

5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su cuccioli di età inferiore alle 7 settimane.

Non utilizzare su cani con lesioni cutanee estese.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

Non utilizzare su gatti.

La deltametrina è estremamente tossica per i gatti. Scalibor® non può in nessun caso essere utilizzato nei gatti. Possono manifestarsi sintomi di avvelenamento particolarmente pericolosi, che possono sfociare in forti crampi muscolari e disturbi della motilità, portando anche alla morte del gatto.

6. EFFETTI COLLATERALI

In rari casi le reazioni di ipersensibilità possono causare alterazioni cutanee locali, eritemi, prurito e perdita del pelo.

Estremamente rara è invece la possibilità di sintomi neurologici come il tremito e l'apatia. In questi casi il collare deve essere rimosso. I sintomi scompaiono nell'arco delle 48 ore seguenti. Se i sintomi persistono, consultare il veterinario. Un'eventuale cura sintomatica mediante diazepam può essere intrapresa.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per applicazione esterna. Utilizzare un solo collare per soggetto. Il collare può essere utilizzato dall'età di 7 settimane.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il collare viene estratto dall'involucro protettivo sigillato e posto attorno al collo dell'animale senza stringerlo. Tra il collare e il collo del cane dovrebbe essere lasciato uno spazio di circa due dita. Fissare il collare con l'apposita fibbia e tagliarlo lasciando 5 cm in eccedenza.

Il collare raggiunge il suo massimo effetto dopo una settimana e dovrebbe quindi essere applicato almeno una settimana prima che l'animale venga introdotto in una zona a rischio di contagio.

Durante i primi 5 giorni dopo la posa del collare, è consigliabile non lasciar fare il bagno al cane. Il collare mantiene il suo effetto per la durata di 4 mesi (pulci), fino a 6 mesi (zecche, flebotomi, zanzare).

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Oltre alla cura del singolo animale, è consigliabile effettuare un trattamento anti-pulci dell'ambiente circostante con mezzi idonei.

In casi rari può accadere durante il periodo di applicazione del collare di osservare la presenza di zecche.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il contatto occasionale con l'acqua non pregiudica l'efficacia del collare, ma esso dovrebbe comunque essere tolto prima di ogni bagno dal momento che il principio attivo è tossico per i pesci ed altri organismi acquatici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Il medicinale è da tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini piccoli tocchino il collare, ci giochino o lo mettano in bocca.

Dopo la manipolazione del collare, lavarsi le mani con acqua fredda e sapone.

Gravidanza e allattamento:

Scalibor® Protectorband può essere utilizzato in cagne in gravidanza e in allattamento.

Interazione con altri medicinali ed altre forme d'interazione:

Non somministrare contemporaneamente ad altri antiparassitari contenenti organofosfati.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di ingestione accidentale del collare da parte del cane, possono verificarsi i seguenti sintomi: scoordinamento dei movimenti, tremore, salivazione, vomito e rigidità degli arti posteriori. Tali sintomi scompaiono nelle successive 48 ore. Se i sintomi persistono, consultare il veterinario. In caso di bisogno si può usare diazepam quale terapia sintomatica.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

11.03.2025

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni di Scalibor® Protectorband ad us. vet., 48 cm e 65 cm: astucci da 1 o 6 collari medicati

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 55995

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.