

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

PACKUNGSBEILAGE

Blockade ad us. vet., Zitzentauchlösung für Kühe

**1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaberin: DeLaval AG, Münchrütichstrasse 2, 6210 Sursee, Switzerland

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: DeLaval NV, Industriepark-Drongen 1, B-9031
Belgium

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Blockade ad us. vet., Zitzentauchlösung für Kühe

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält

Wirkstoff:

Iod 2.56 mg (entsprechend 0.25% w/w) als Iod-Poloxamer 335-Komplex

Sonstige Bestandteile:

Citronensäure-Monohydrat

Glycerol

Povidon

Natriumiodid

Natriumhydroxid

Sorbitol 70%

Xanthangummi

Gereinigtes Wasser

Natriumchlorid

Poloxamer 335

Natriumiodat

Visköse, dunkelbraune Flüssigkeit.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Vorbeugen gegen Euterinfektionen bei Kühen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

7. ZIELTIERART(EN)

Kühe

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Blockade liegt als gebrauchsfertige Lösung vor, die sich zur Zitzendesinfektion nach dem Melken eignet.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Lösung nicht verdünnen. Nicht mit anderen Chemikalien vermischen.

Verschmutztes Mittel unbedingt verwerfen. Immer sauberen Zitzentauchbecher verwenden.

10. WARTEZEIT(EN)

Milch und essbare Gewebe: keine

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Im geschlossenen Originalgebinde aufrecht stehend lagern.

Nicht über 25°C lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Frost schützen.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 6 Monate.

Das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Wenn Krankheitsanzeichen sich nicht bessern oder neu erscheinen unbedingt den Tierarzt konsultieren. Nur äusserlich anwenden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender: Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen. Nach versehentlichem Verschlucken sofort grosse Mengen Wasser trinken und den Arzt aufsuchen. Nach Gebrauch Hände waschen.

Trächtigkeit und Laktation: Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Inkompatibilitäten: Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Blockade darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

27.01.2023

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Blockade ad us.vet. ist ein gebrauchsfertiges Sitzendesinfektionsmittel auf Jodbasis für den täglichen Gebrauch nach dem Melken. Blockade kombiniert eine hervorragende Hautpflege mit effektiver Desinfektion aufgrund des stabilen Gehalts von frei verfügbarem Iod. Es hat einen hautfreundlichen pH-Wert. Blockade wird direkt nach dem Melken im Tauchverfahren angewendet.

ATCvet-Code: QG52A

Packungen 5L, 10L, 20L und 60L, in grauen High Density Polyethylen-

Behältern (HDPE), mit Drehverschlussdeckeln und Siegeln. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie E: frei verkäuflich ohne Fachberatung

Swissmedic 55996