

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Milbemax Chat S ad us. vet., comprimés pelliculés appétents pour chats

Milbemax Chat M ad us. vet., comprimés pelliculés appétents pour chats

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Elanco Santé Animale SA

Mattenstrasse 24A

4058 Bâle

Suisse

Fabricant responsable de la libération des lots:

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

France

Elanco Santé Animale SA

Mattenstrasse 24A

4058 Bâle

Suisse

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Milbemax Chat S ad us. vet., comprimés pelliculés appétents pour chats

Milbemax Chat M ad us. vet., comprimés pelliculés appétents pour chats

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

Substances actives:

Milbemax Chat S:

Milbémycine-oxime 4,0 mg

Praziquantel 10,0 mg

Comprimé pelliculé. Administrer par voie orale. Comprimé pelliculé beige à brun, oblong, à l'arôme artificiel de bœuf, avec une barrette de sécabilité sur les deux faces et gravé d'un côté «BC» et de l'autre «NA».

Milbemax Chat M:

Milbémycine-oxime 16,0 mg

Praziquantel 40,0 mg

Comprimé pelliculé. Administrer par voie orale. Comprimé pelliculé rougeâtre à rouge-brun, oblong, à l'arôme artificiel de bœuf, avec une barrette de sécabilité sur les deux faces et gravé d'un côté «KK» et de l'autre «NA».

Excipient:

Milbemax Chat M:

Oxyde de fer rouge (E172) 0,288 mg

4 INDICATION(S)

Milbemax peut être employé en cas d'infections mixtes par les cestodes et nématodes adultes:

- Le traitement des infestations par les ankylostomes, les vers ronds et les vers plats. Milbemax est efficace contre les stades adultes de *Ancylostoma tubaeforme* (y compris L4), *Toxocara cati* (y compris L4), *Toxascaris leonina*, et contre les stades immatures et adultes de *Dipylidium caninum*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Taenia* spp., *Echinococcus* spp. et *Mesocestoides* spp.
- Le traitement préventif des atteintes dues aux vers du cœur (*Dirofilaria immitis*).

5 CONTRE-INDICATIONS

Milbemax Chat S:

Ne pas utiliser chez les chats de moins de 0,5 kg.

Milbemax Chat M:

Ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas, particulièrement chez les jeunes chats, des réactions d'hypersensibilité, des signes systémiques (telle qu'une léthargie), des signes neurologiques (tels que de l'ataxie et des tremblements musculaires) et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que des vomissements et diarrhées) ont été observés après administration du médicament vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)

- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Les comprimés Milbemax doivent être administrés en fonction du poids corporel du chat. Administrer le produit vétérinaire avec ou directement après un repas. La posologie minimale est de 2 mg de milbémycine-oxime et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel.

Poids corporel	Milbemax Chat S	Milbemax Chat M
0,5 - 1 kg	½ comprimé	
> 1 - 2 kg	1 comprimé	
> 2 - 4 kg		½ comprimé
> 4 - 8 kg		1 comprimé

Les vermifugations des chatons se pratiquent à l'âge de 6 semaines puis tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Les femelles allaitantes devraient être traitées en même temps que leurs petits. Les chats adultes doivent être vermifugés 4 fois par an.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Le médicament vétérinaire doit être administré avec ou après un peu de nourriture.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver en dessous de 25°C.

Protéger de la lumière et de l'humidité.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Informations sur la durée de conservation des demi-comprimés : 1 mois

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Milbemax Chats S: poids minimal 0,5 kg; Milbemax Chats M: poids minimal 2 kg

S'assurer que les chats et les chatons pesant entre 0,5 et ≤ 2 kg reçoivent le comprimé de dosage approprié (4 mg milbémycine-oxime/10 mg praziquantel) et la dose appropriée (1/2 ou 1 comprimé) pour l'échelle de poids correspondante (1/2 comprimé pour les chats pesant de 0,5 kg à 1 kg; 1 comprimé pour les chats pesant de > 1 à 2 kg).

Afin de développer un programme efficace de contrôle des vers, il faut tenir compte des conditions locales concernant la présence de vers plats et de vers ronds, ainsi que du risque d'infection du chat.

Il est recommandé de traiter de façon concomitante tous les animaux vivant dans le même foyer. Lorsque l'infestation par le cestode *D. caninum* a été confirmée, un traitement concomitant contre les hôtes intermédiaires, tels que les puces et les poux, doit être discuté avec un vétérinaire pour prévenir la ré-infestation.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

En cas d'échinococcose, il existe un risque de contagion pour l'homme. Des directives particulières doivent donc être respectées en ce qui concerne le traitement, les contrôles ultérieurs nécessaires et la protection des personnes. Pour ce faire, on fera appel à des vétérinaires ou des centres spécialisés en parasitologie.

Aucun essai n'a été réalisé sur des chats très affaiblis ou atteints d'une insuffisance rénale ou hépatique sévère. Pour ces chats, l'utilisation du médicament vétérinaire n'est pas recommandée ou seulement après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre immédiatement l'avis d'un médecin et lui montrer la boîte et/ou la notice.

Gestation et lactation:

Milbemax peut être administré aux femelles allaitantes ou gravides.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Aucune connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

En cas de surdosage, en particulier chez les jeunes animaux, peuvent survenir de façon passagère et autolimitée une mydriase, une ataxie ou des tremblements musculaires. Ces symptômes disparaissent au bout d'un jour sans aucun traitement.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement. Milbemax ne doit pas être déversé dans les cours d'eau, car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

15.02.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Présentations:

Milbemax Chat S:

Boite contenant 2 blisters de 10 comprimés chacun

Milbemax Chat M:

Conditionnement de 24 boîtes de 4 comprimés chacune sous blister

Boite contenant 5 blisters de 10 comprimés chacun

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 55997

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.