

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

DoxyCat® 20 ad us. vet., compresse divisibili per gatti.

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Ceva Santé Animale, Zone autoroutière, 53950 Louverné, Francia.

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DoxyCat® 20 ad us. vet., compresse divisibili per gatti.

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Doxiciclina (come doxiciclina iclato) 20 mg

Compressa di colore da beige a giallo-beige con linea di frattura.

4. INDICAZIONE(I)

Antibiotico per gatti.

Infezioni causate da germi sensibili alla doxiciclina nel gatto: infezioni dell'apparato respiratorio.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o a uno degli altri eccipienti del medicamento.

Non utilizzare in animali con disturbi della deglutizione o malattie associate a vomito.

Non usare in animali con nota fotosensibilità.

Non usare in animali con insufficienza epatica.

6. EFFETTI COLLATERALI

La somministrazione prolungata di un principio attivo appartenente alla classe delle tetracicline (come quello contenuto in DoxyCat® 20) durante la crescita dei denti può causare una colorazione giallastra dei denti. Nel caso del principio attivo di DoxyCat® 20 questo rischio è inferiore rispetto ad altre tetracicline.

A seguito di contatto con luce ultravioletta intensa, durante il trattamento con tetracicline sono state osservate reazioni di fotosensibilità.

Dopo il trattamento con tetracicline sono stati segnalati vomito, esofagite e diarrea. Pertanto il medicamento non deve essere somministrato a pazienti con disturbi della deglutizione o disturbi associati a vomito.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatto.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

10 mg di doxiciclina per kg di peso corporeo una volta al giorno per 3-5 giorni nei casi a rapida evoluzione (acuti) e per 8-10 giorni nei casi a evoluzione lenta (cronici), ovvero 1 compressa di DoxyCat® 20 ogni 2 kg di peso corporeo al giorno.

Peso corporeo	Compresse
1 kg	½
2 kg	1
3 kg	1½
4 kg	2
5 kg	2 ½
6 kg	3

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le compresse devono essere somministrate insieme al mangime (vedere paragrafo 12).

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

DoxyCat® deve essere somministrato con il mangime per ridurre la probabilità di vomito e l'insorgenza di esofagite.

poiché il medicamento veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti cerchino miratamente le compresse e le assumano in quantità eccessiva. Pertanto il preparato deve essere conservato fuori dalla portata degli animali.

L'impiego del medicamento veterinario deve basarsi sull'identificazione e sul test di suscettibilità dei patogeni bersaglio. Qualora ciò non sia possibile, la terapia deve basarsi su informazioni epidemiologiche e sulla conoscenza della suscettibilità del patogeno bersaglio a livello locale/regionale. L'uso non conforme a quanto specificato nell'informazione professionale del medicamento veterinario può aumentare la frequenza di batteri resistenti al principio attivo di DoxyCat® e ridurre l'efficacia del trattamento con altri medicinali appartenenti alla stessa classe (tetracicline). L'uso del medicamento veterinario deve avvenire nel rispetto delle direttive ufficiali, nazionali e regionali che regolano l'impiego degli antibiotici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Le persone con sensibilità nota alle tetracicline devono evitare il contatto con il medicamento veterinario.

Lavarsi le mani dopo l'uso. In caso di reazioni dopo il contatto con il medicamento veterinario (ad es. eruzione cutanea), rivolgersi immediatamente a una medica/un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento: DoxyCat® 20 è ben tollerato durante la gravidanza o l'allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non somministrare in combinazione con certi altri antibiotici.

In caso di somministrazione concomitante, diversi medicinali (ad es. preparati contenenti ferro o certi medicinali per il trattamento dell'epilessia o la neutralizzazione dei succhi gastrici) possono alterare le proprietà del principio attivo contenuto in DoxyCat® 20. Consultare la propria veterinaria/il proprio veterinario.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali effetti devono essere trattati dalla veterinaria/dal veterinario.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

08.02.2024

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole contenente 2 o 10 blister da 12 compresse ciascuno.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 56'112.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.