

## Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Zitac<sup>®</sup> vet 100 ad us. vet., Tabletten für Hunde

Zitac<sup>®</sup> vet 200 ad us. vet., Tabletten für Hunde

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: MSD Animal Health GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Intervet GesmbH, Siemensstrasse 105, 1210 Wien, AT

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Zitac<sup>®</sup> vet 100 ad us. vet., Tabletten für Hunde

Zitac<sup>®</sup> vet 200 ad us. vet., Tabletten für Hunde

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:

**Wirkstoff:**

Cimetidin 100 mg resp. 200 mg

Längliche Tabletten mit beidseitiger Bruchrille, deren Eignung zur Halbierung belegt wurde.

#### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bei Hunden ist Zitac<sup>®</sup> vet indiziert:

- bei allen Erkrankungen, die eine Verringerung der Magensäuresekretion erfordern, insbesondere zur Verminderung von Erbrechen infolge chronischer Magenschleimhautentzündung sowie
- zur Vorbeuge- und Begleittherapie bei einer durch Nierenprobleme verursachten Magenschleimhautentzündung und bei Gabe von Schmerzmitteln.

#### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Cimetidin anwenden.

#### 6. NEBENWIRKUNGEN

Vorübergehende Schwellungen des Gesäuges (Gynäkomastie) bei Hündinnen können durch die hemmende Wirkung erklärt werden, die Cimetidin auf männliche Sexualhormone hat. Die

Schwellungen klingen ohne Behandlung ab. Bei männlichen Ratten und Rüden wurde eine Verringerung des Prostata-Gewichts beobachtet, die jedoch keinen Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit hat, auch diese Wirkung ist vorübergehend.

## 7. ZIELTIERART(EN)

Hund

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

5 – 10 mg Cimetidin pro kg Körpergewicht (KGW) 3mal täglich per os, entsprechend:

Körpergewicht	Anzahl Zitac® vet 100 mg Tabletten	Anzahl Zitac® vet 200 mg Tabletten
6 – 10 kg	½ - 1	
11 – 20 kg	1 - 2	½ - 1
21 – 40 kg		1 - 2
41 – 60 kg		1½ - 3

Zitac® vet sollte dem Tier auf nüchternen Magen verabreicht werden.

Die Behandlung mit Zitac® vet wird im Allgemeinen innerhalb kurzer Zeit zu einer Verringerung der Anzeichen von Beschwerden führen, ohne deren Ursache zu beseitigen. Ein andauerndes Behandlungsergebnis wird hingegen davon abhängen, in welchem Ausmass die Magenschleimhautentzündung geheilt werden kann. Daher kann es angezeigt sein, die Behandlung während mehr als einem Monat fortzuführen.

Begleitende diätetische Massnahmen wie die Umstellung der Ernährung auf ein hypoallergenes Diätfutter sind zu empfehlen.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Zur oralen Verabreichung.

## 10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei Hunden mit Nierenproblemen sollte die Dosierung von Zitac® vet entsprechend dem Schweregrad des Problems reduziert werden, da die Ausscheidung des Wirkstoffes reduziert sein kann.

Die Behandlung mit dem in Zitac® vet enthaltenen Wirkstoff Cimetidin kann die ursächlichen Veränderungen die mit einer Magenschleimhautentzündung einhergehen alleine nicht aufheben, sondern lediglich die damit einhergehenden Symptome mildern.

Hunde, die ständig erbrechen sollten gründlich untersucht werden, um die zu Grunde liegende Ursache zu finden. Dies ist besonders bei älteren Tieren wichtig.

### Trächtigkeit und Laktation:

Cimetidin geht in die Milch über. Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Cimetidin greift in den Leberstoffwechsel ein. Dies kann die Ausscheidung gewisser Arzneimittel beeinflussen. Falls dem Hund neben Zitac® vet weitere Tierarzneimittel verabreicht werden müssen, soll dies darum vorgängig mit dem behandelnden Tierarzt abgesprochen werden.

### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Es wurde nachgewiesen, dass Hunde Cimetidin in der Formulierung dieses Tierarzneimittels bei oraler Verabreichung von 75 mg/kg Körpergewicht täglich (das 5-fache der empfohlenen Tagesdosis) über 91 Tage gut vertrugen.

Spezielle Symptome bei Überdosierung sind nicht bekannt.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

## **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

27.07.2022

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. WEITERE ANGABEN**

Packungen:

Zitac® vet 100: Faltschachtel mit 10 Blistern à 10 Tabletten mit Bruchrille

Zitac® vet 200: Faltschachtel mit 10 Blistern à 10 Tabletten mit Bruchrille

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 56171

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.