

Albex ad us. vet.

ORALE SUSPENSION

Breitspektrum-Anthelminthikum für Rinder, Schafe und Ziegen

Zusammensetzung

1 ml orale Suspension enthält:

Albendazolum 100mg

Conserv.: E 216, E 218

Color.: E 142

Excip. ad suspens.

Eigenschaften / Wirkungen

Albex 10% ad us. vet. verfügt über ein breites Wirkungsspektrum, das Lungenwürmer, Bandwürmer, ausgewachsene Leberegel und Magen- Darm-Rundwürmer und -Eier umfasst. Die Dosierungsvorschrift ist genau zu beachten.

Indikationen

Infestation mit Albendazol-empfindlichen Parasiten

Rinder:

Rundwürmer: *Ostertagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Cooperia* und *Strongyloides spp.* Es ist teilweise wirksam gegen die Larven von *Cooperia* und *Ostertagia*.

Lungenwürmer: *Dictyocaulus viviparus*

Bandwürmer: *Moniezia spp.*

Ausgewachsene Leberegel: *Fasciola hepatica*.

Schafe, Ziegen:

Rundwürmer: *Ostertagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus* (inkl. *N. battus*), *Chabertia* und *Oesophagostomum*. Es ist teilweise wirksam gegen die Larven von *Ostertagia*.

Lungenwürmer: *Dictyocaulus filaria*

Bandwürmer: *Moniezia spp.*

Ausgewachsene Leberegel: *Fasciola hepatica*.

Dosierung/Anwendung

Ringer			Schafe/ Ziegen		
kg KGW	Würmer (7,5 mg/kg)	Egel + Würmer (10 mg/kg)	kg KGW	Würmer (5,0 mg/kg)	Egel + Würmer (7,5 mg/kg)
50 kg	3,75 ml	5,0 ml	0 – 10 kg	0,5 ml	0,75 ml
100 kg	7,5 ml	10,0 ml	11 – 20 kg	1,0 ml	1,50 ml
200 kg	15,00 ml	20,0 ml	21 – 30 kg	1,5 ml	2,25 ml
300 kg	22,50 ml	30,0 ml	31 – 40 kg	2,0 ml	3,00 ml
400 kg	30,00 ml	40,0 ml	41 – 50 kg	2,5 ml	3,75 ml
500 kg	37,50 ml	50,0 ml	51 – 60 kg	3,0 ml	4,50 ml
600 kg	45,00 ml	60,0 ml	61 – 70 kg	3,5 ml	5,25 ml
700 kg	52,50 ml	70,0 ml	71 – 80 kg	4,0 ml	6,00 ml

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Während des ersten Trächtigkeitsmonats und während der Deckzeit ist ab einer Dosis von 7,5 mg/kg das teratogene Potenzial von Albendazol zu beachten.

Der intensive Gebrauch von Anthelminthika kann zu Resistenzbildung führen. Um das Risiko zu vermindern sollte das Behandlungsprogramm mit dem Tierarzt abgesprochen werden.

Absetzfristen

Rinder, Kühe:

Milch : 5 Tage

Essbares Gewebe : 21 Tg

Schafe, Ziegen:

Milch : 5 Tage

Essbares Gewebe : 21 Tg

Sonstige Hinweise

Vor Kinderhänden geschützt aufbewahren.

Direkten Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Nach Gebrauch Hände waschen.

Packung: Flasche zu 1l mit 60ml Dosier-Injektor mit 1 ml-Einteilung.

Stand der Information: Januar 2003

Swissmedic 56'304 003 (B)

ATC Vet Code: QP52AC11

Hersteller :

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea, Co. Galway, Ireland

Vertrieb Schweiz :

Werner Stricker AG, 3053 Münchenbuchsee

Domizil: 3052 Zollikofen