

## INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Prurivet N ad us. vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde, Katzen und andere Heimtiere

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

ZulassungsinhaberIn: Vetoquinol AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Bern

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierow Gdynskich 13/14, 66-400 Gorzow Wielkopolski, Polen

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Prurivet N ad us.vet., Lösung zum Auftragen auf die Haut für Hunde, Katzen und andere Heimtiere

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Lösung enthält:

##### Wirkstoffe:

Chloramphenicol 11.17 mg

Benzylbenzoat 93.11 mg

Dexamethason 0.47 mg

##### Sonstige Bestandteile:

Alpha-Tocopherolacetat-Trockenkonzentrat 0.47 mg

Klare, grünlich-gelbe, ölige Lösung zum Auftragen auf die Haut.

#### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur äusserlichen, örtlich begrenzten Behandlung gegen Bakterien, Parasiten, Entzündungen, Allergien, Schmerz und Juckreiz bei Hund, Katze und anderen Heimtieren; auch zur Ergänzung von Allgemeinbehandlungen.

#### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

Nicht anwenden bei Hautgeschwüren.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

## **6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

## **7. ZIELTIERART(EN)**

Hunde, Katzen und andere Heimtiere

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Je nach Schwere der Erkrankung 1 – 3x täglich die erkrankte Haut und die nähere Umgebung mit geringer Flüssigkeitsmenge befeuchten.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Prurivet N dringt schnell und leicht in das Haarkleid und in Hautfalten ein und haftet gut. Dies erleichtert die Verabreichung (keine mechanische Reizung!) vor allem bei stark entzündeten Hautstellen und nicht geschorenem Haarkleid.

## **10. WARTEZEIT(EN)**

Darf nicht bei Tieren angewendet werden, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit verwendbar bis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Aufgrund der Resorption von dem im Tierarzneimittel enthaltenen Wirkstoff Dexamethason sind Nebenwirkungen, welche auch nicht örtlich begrenzt sind, nicht auszuschliessen, insbesondere bei grossflächigen Hautläsionen.

Vor der Anwendung von Prurivet N sollte durch den Tierarzt ein Antibiogramm gefertigt werden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Bei der Anwendung Handschuhe tragen.

Nach der Anwendung Hände waschen.

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder den sonstigen Bestandteilen sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Bei versehentlichem Haut-, Schleimhaut- oder Augenkontakt – einschliesslich Hand-zu-Mund-Kontakt – mit sauberem fliessendem Wasser reinigen/spülen.

Bei einer Überempfindlichkeitsreaktion oder anhaltender Reizung ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

12.12.2022

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. WEITERE ANGABEN**

Faltschachtel mit 1 Plastikflasche à 100 ml mit Schraubverschluss.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 56317

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.