

## Informazione per i detentori di animali

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

AmoxiDog<sup>®</sup> S 200 ad us. vet., compresse divisibili per cani

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, [hotline@biokema.ch](mailto:hotline@biokema.ch).  
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Ceva Santé Animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutière, 53950 LOUVERNE, Francia.

#### 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

AmoxiDog<sup>®</sup> S 200 ad us. vet., compresse divisibili per cani

#### 3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

**Principio attivo:**

Amoxicillina (come triidrato) 200 mg

Comprese rotonde, di colore beige, con una incisione a croce, divisibili in due metà.

#### 4. INDICAZIONE(I)

Trattamento di infezioni batteriche nel cane causate da microrganismi sensibili all'amoxicillina, in particolare infezioni delle vie respiratorie, della pelle (ferite, infezioni della pelle, raccolte di pus infetto, infiammazioni della pelle di origine batterica) e del tratto digerente.

#### 5. CONTROINDICAZIONI

Non usare nei cani con nota ipersensibilità alle penicilline o ad altre sostanze del gruppo dei  $\beta$ -lattamici.

Non somministrare a conigli, porcellini d'India, criceti, gerbillini e cincillà.

#### 6. EFFETTI COLLATERALI

Dopo la somministrazione possono manifestarsi sintomi digestivi (diarrea, vomito).

Non comunemente possono manifestarsi reazioni allergiche (reazioni della pelle, reazione allergica acuta). In caso di allergie, il trattamento deve essere interrotto.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani.

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale.

4-10 mg di amoxicillina per kg di peso corporeo al mattino e alla sera per almeno 5 giorni. Per il trattamento di infezioni da batteri gram-negativi e negli animali giovani, in generale si raccomanda il dosaggio più alto.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Nel caso in cui, in base allo schema di dosaggio selezionato, le compresse debbano essere divise a metà, procedere alla divisione con l'aiuto di un coltello.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: non superare il dosaggio prescritto. Non prolungare il trattamento senza motivo. È richiesta cautela nell'uso in caso di insufficienza del fegato o dei reni.

Poiché il medicamento veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti cerchino miratamente le compresse e le assumano in quantità eccessiva. Pertanto il preparato deve essere conservato fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: le penicilline e le cefalosporine possono scatenare allergia in seguito a iniezione, inalazione, assunzione per bocca o contatto con la pelle. L'allergia alle penicilline può generare un'allergia crociata alle cefalosporine e viceversa. Talvolta, le reazioni allergiche a queste sostanze possono essere gravi.

Le persone con nota ipersensibilità alle penicilline o alle cefalosporine o alle quali è stato sconsigliato di usare questi prodotti devono evitare contatti con il medicamento veterinario.

Per evitare l'esposizione, usare il medicamento nel rispetto di tutte le misure precauzionali raccomandate. Se in seguito a un'esposizione si sviluppano sintomi quali un'eruzione della pelle, consulti immediatamente un medico e gli mostri questa avvertenza. Sintomi quali gonfiore del viso,

delle labbra o delle palpebre o dispnea devono essere presi sul serio e richiedono assistenza medica immediata.

Lavare le mani dopo l'uso delle compresse.

Gravidanza e allattamento: AmoxiDog® S 200 può essere somministrato durante la gravidanza o l'allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: i macrolidi e le tetracicline possono inibire l'effetto delle penicilline.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

### **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

23.09.2020

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Scatola contenente 2 o 10 blister da 10 compresse divisibili ciascuno.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 56'874

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.