

# CEFADOG® 300

ad. us. vet.  
Antibiotikum für Hunde

## ZUSAMMENSETZUNG

Cefalexinum (ut monohydricum) 300 mg, Aromatica, Excipients pro Compresso.

## EIGENSCHAFTEN/WIRKUNGEN

Cefalexin, ein halbsynthetisches, bakterizides Antibiotikum aus der Familie der  $\beta$ -Laktame (Cephalosporine der ersten Generation) ist wirksam gegen *Staphylococcus intermedius* und *Staphylococcus aureus*, d.h. Bakterien, die häufig für Hautaffektionen beim Hund verantwortlich sind. Cefalexin verursacht eine strukturelle Schädigung der Bakterienwand, welche zu einem Prolaps der zytoplasmatischen Membran führt und dadurch die Bakterien abtötet.

## PHARMAKOKINETIK

Die Bioverfügbarkeit beträgt nach peroraler Verabreichung ca. 80%. Die maximale Konzentration beträgt bei Verabreichung gemäss dem empfohlenen Dosierungsschema 16  $\mu\text{g/ml}$  und wird nach 2 Stunden erreicht. Die Halbwertszeit der Ausscheidung beträgt 1,5 Stunden. Die Kinetik von Cefalexin bleibt nach wiederholter Verabreichung unverändert.

## INDIKATIONEN

Infektionen verursacht durch Cefalexin-empfindliche Keime. Behandlung der oberflächlichen Pyodermien beim Hund.

## DOSIERUNG/ANWENDUNG

Oral. Zweimal täglich 15 mg Cefalexin pro kg Körpergewicht, d.h. eine Tablette pro 20 kg Körpergewicht zweimal täglich, während 21 Tagen und nach folgender Dosierung:

<b>Gewicht des Tieres</b>	<b>Anzahl Tabletten morgens und abends</b>	<b>Gewicht des Tieres</b>	<b>Anzahl Tabletten morgens und abends</b>
4-7 kg	1/4	23-27 kg	1 1/4
8-12 kg	1/2	28-32 kg	1 1/2
13-17 kg	3/4	33-37 kg	1 3/4
18-22 kg	1	38-42 kg	2

Die Behandlung soll mit einem geeigneten Medizinalshampoo unterstützt werden.

## **ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN**

### *Kontraindikationen:*

Hypersensibilität auf Cefalexin oder andere  $\beta$ -Laktame.

### *Vorsichtsmassnahmen:*

Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

## **UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN**

Selten wurde Erbrechen, Durchfall, Anorexie und Apathie beobachtet.

## **SONSTIGE HINWEISE**

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25°C aufbewahren. Im Originalbehältnis aufbewahren. Hände nach der Anwendung waschen. Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Swissmedic 57'356 001 (A)  
ATCvet QJ01DB01

## **PACKUNG**

Packung zu 10 x 10 teilbaren Tabletten.

### **Stand der Information**

Juli 2017

### **Zulassungsinhaberin**

Biokema SA  
Crissier-Lausanne