

# CEFADOG® 300

ad. us. vet.  
Antibiotique pour chien

## COMPOSITION

Cefalexinum (ut monohydricum) 300 mg, Aromatica, Excipients pro Compresso.

## PROPRIÉTÉS/EFFETS

La cefalexine, antibiotique bactéricide semi-synthétique de la famille des  $\beta$ -lactamines (groupe des cephalosporines de première génération), est active vis-à-vis de bactéries impliquées dans les affections dermatologiques du chien telles que *Staphylococcus intermedius* et *Staphylococcus aureus*. Elle agit en induisant une lésion structurelle de la paroi bactérienne, conduisant à un prolapsus de la membrane cytoplasmique, provoquant la mort bactérienne.

## PHARMACOCINÉTIQUE

La biodisponibilité est d'environ 80% après administration par voie orale. La concentration maximale, après administration selon le schéma posologique préconise, est de 16  $\mu\text{g/ml}$ , et est atteinte en 2 heures. La demi-vie d'élimination est de 1,5 heures. La cinétique de la céfalexine reste inchangée à la suite d'administrations répétées.

## INDICATIONS

Affections à germes sensibles à la céfalexine. Traitement des pyodermies superficielles chez le chien.

## POSOLOGIE/MODE D'EMPLOI

Voie orale. 15 mg de céfalexine par kg de poids corporel 2 fois par jour, soit un comprimé pour 20 kg de poids corporel 2 fois par jour, pendant 21 jours et selon la posologie suivante:

<b>Poids de l'animal</b>	<b>Nbre de comprimés matin et soir</b>	<b>Poids de l'animal</b>	<b>Nbre de comprimés matin et soir</b>
4-7 kg	1/4	23-27 kg	1 1/4
8-12 kg	1/2	28-32 kg	1 1/2
13-17 kg	3/4	33-37 kg	1 3/4

<b>Poids de l'animal</b>	Nbre de comprimés matin et soir	<b>Poids de l'animal</b>	Nbre de comprimés matin et soir
18-22 kg	1	38-42 kg	2

Il est conseillé de soutenir le traitement avec un shampoing médical approprié.

## LIMITATIONS D'EMPLOI

*Contre-indications:*

hypersensibilité à la céfalexine ou aux autres  $\beta$ -lactamines.

*Précautions:*

Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

## EFFETS INDÉSIRABLES

De rares réactions transitoires de vomissements, diarrhées, anorexie et apathie ont été observées.

## REMARQUES PARTICULIÈRES

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine. Se laver les mains après utilisation. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «Exp.».

Swissmedic 57'356 001 (A)  
ATCvet QJ01DB01

## PRÉSENTATION

Emballage de 10 x 10 comprimés quadrisécables.

**Mise à jour de l'information**

Juillet 2017

**Titulaire de l'autorisation**

Biokema SA  
Crissier-Lausanne