

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Metacam® 1 mg ad us. vet, comprimés à croquer pour chiens

Metacam® 2,5 mg ad us. vet, comprimés à croquer pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, 4057 Bâle

Fabricant responsable de la libération des lots :

Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V., Calle Maiz 49, Barrio Xaltocan, Del. Xochimilco, C.P. 16090, Mexico, D.F., Mexico

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Metacam 1 mg ad us. vet, comprimés à croquer pour chiens

Metacam 2,5 mg ad us. vet, comprimés à croquer pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Un comprimé à croquer contient :

Méloxicam 1 mg

Méloxicam 2,5 mg

Comprimé rond biconvexe beige tacheté, sécable sur la face supérieure avec une impression en creux du code « M10 » ou « M25 » sur l'une des faces.

Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

4 INDICATION(S)

Traitement des troubles musculo-squelettiques aigus et chroniques chez les chiens, comme par exemple les maladies de la colonne vertébrale et des articulations, les contusions, les entorses, les foulures, les boiteries et les processus inflammatoires douloureux de l'appareil locomoteur en général.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes.

Ne pas utiliser chez les animaux atteints de troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux, ni chez les chiens sujets au risque d'ulcérations ou d'hémorragies gastro-intestinales.

Ne pas utiliser chez les animaux atteints de troubles avérés de la coagulation sanguine.

Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 6 semaines ou de moins de 4 kg de poids corporel.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Une perte d'appétit, des vomissements, une diarrhée, des selles poisseuses et noires, une léthargie et une insuffisance rénale ont été rapportés de manière peu fréquente.

Dans de très rares cas, une diarrhée hémorragique, une hématomèse, des ulcérations gastro-intestinales et une élévation des enzymes hépatiques ont été rapportées.

Ces effets indésirables apparaissent généralement au cours des premières deux semaines de traitement. Ils sont dans la plupart des cas transitoires et disparaissent à la suite de l'arrêt du traitement, mais ils peuvent être sévères ou fatals dans de très rares cas.

Si des effets indésirables apparaissent, le traitement devra être interrompu et l'avis d'un vétérinaire demandé.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Posologie :

Le traitement initial consiste en l'administration d'une dose unique de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids corporel (soit sous forme orale soit en injection avec Metacam 5 mg/ml solution injectable).

Notice d'emballage des médicaments à usage vétérinaire

Le traitement se poursuivra par l'administration orale une fois par jour (à intervalles de 24 heures) d'une dose d'entretien de 0,1 mg de méloxicam par kg de poids corporel.

Chaque comprimé à croquer contient 1 mg ou 2,5 mg de méloxicam, ce qui correspond respectivement à la dose d'entretien pour un chien de 10 kg de poids corporel ou pour un chien de 25 kg de poids corporel.

Chaque comprimé à croquer peut être divisé en deux pour un dosage précis adapté au poids du chien.

Metacam comprimés à croquer peut être administré avec ou sans nourriture et est aromatisé, ce qui permet une prise volontaire par la plupart des chiens.

Schéma de dosage pour le traitement d'entretien :

Poids corporel (kg)	Nombre de comprimés à croquer		mg/kg
	1 mg	2,5 mg	
4,0–7,0	½		0,13–0,1
7,1–10,0	1		0,14–0,1
10,1–15,0	1½		0,15–0,1
15,1–20,0	2		0,13–0,1
20,1–25,0		1	0,12–0,1
25,1–35,0		1½	0,15–0,1
35,1–50,0		2	0,14–0,1

Si l'on recherche un dosage encore plus précis, l'utilisation de Metacam suspension orale pour chiens peut être pris en considération. L'utilisation de Metacam suspension orale pour chiens est recommandée pour les chiens de moins de 4 kg.

La réponse clinique est habituellement observée dans les 3 à 4 jours. En l'absence d'amélioration clinique, le traitement doit être arrêté au bout de 10 jours maximum.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Veiller soigneusement à l'exactitude de la dose. **Suivre précisément la prescription du vétérinaire.**
Instructions pour ouvrir les plaquettes thermoformées avec fermeture sécurité enfant : Pousser le comprimé hors de la plaquette.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Les comprimés étant très appréciés par les chiens, le risque existe que ces derniers les recherchent et en absorbent en trop grande quantité. Les comprimés à croquer doivent donc être conservés hors de la portée des animaux.

Il faut veiller à un apport d'eau suffisant pendant la durée du traitement. Des traitements de durée plus longue exigent des contrôles du bilan sanguin par le vétérinaire.

Éviter l'emploi chez l'animal déshydraté, hypovolémique ou hypotendu, en raison des risques potentiels de toxicité rénale.

Comme pour tous les antiphlogistiques non stéroïdiens, le traitement de chiens affaiblis par l'âge comporte un risque accru. Lorsque l'utilisation du produit ne peut être évitée chez de tels animaux, l'administration doit se faire sous surveillance clinique attentive.

Ce produit pour chiens ne doit pas être utilisé chez les chats car il n'est pas adapté à l'utilisation dans cette espèce. Chez les chats, utiliser Metacam 0,5 mg/ml suspension orale pour chats.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : En cas d'auto-administration accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Gestation et lactation :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation. Voir rubrique « Contre-indications »

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

L'association de Metacam comprimés à croquer avec certains autres médicaments (vétérinaires) peut conduire à des effets toxiques. Ce médicament vétérinaire ne doit en particulier pas être administré conjointement avec d'autres médicaments anti-inflammatoires (antiphlogistiques non stéroïdiens ou glucocorticoïdes).

L'administration concomitante de produits potentiellement néphrotoxiques doit être évitée.

Un traitement préalable par des substances anti-inflammatoires peut entraîner l'apparition ou l'aggravation d'effets indésirables. Il est donc recommandé d'observer une période libre de traitements avec de tels médicaments d'au moins 24 heures avant l'utilisation de Metacam. Pour estimer la durée de cette période libre de traitements, le vétérinaire doit toutefois prendre en compte les propriétés pharmacologiques des médicaments utilisés précédemment.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

En cas de surdosage, le vétérinaire doit instaurer un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

04.11.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et <http://www.tierarzneimittel.ch/>.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Metacam 1 mg comprimés à croquer pour chiens : boîte de 84 comprimés en plaquettes alu/alu

Metacam 2,5 mg comprimés à croquer pour chiens : boîte de 84 comprimés en plaquettes alu/alu

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 57710

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.