

**INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI**

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

**Metacam® 1 mg ad us. vet, compresse masticabili per cani**

**Metacam® 2,5 mg ad us. vet, compresse masticabili per cani**

**1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.**

Titolare dell'omologazione:

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V., Calle Maiz 49, Barrio Xaltocan, Del. Xochimilco, C.P. 16090, Mexico, D.F., Mexico

**2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Metacam 1 mg ad us. vet, compresse masticabili per cani

Metacam 2,5 mg ad us. vet, compresse masticabili per cani

**3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

Una compressa masticabile contiene:

Meloxicam 1 mg

Meloxicam 2,5 mg

Compressa rotonda biconvessa beige screziato, incisa sul lato superiore con impresso il codice "M10" oppure "M25" su un lato.

La compressa può essere divisa in due metà uguali.

**4 INDICAZIONE(I)**

Trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici nei cani, come le malattie della colonna vertebrale e delle articolazioni, contusioni, distorsioni, stiramenti, zoppie e processi infiammatori dolorosi del sistema muscolo-scheletrico in generale.

**5 CONTROINDICAZIONI**

Non usare in animali in gravidanza o in allattamento.

Non usare in animali con funzionalità epatica, cardiaca o renale compromesse o in cani a rischio di ulcere o emorragie gastrointestinali.

Non usare in animali con disturbi provati della coagulazione del sangue.

Non usare in cani di età inferiore a 6 settimane o di peso corporeo inferiore a 4 kg.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

### **6 EFFETTI COLLATERALI**

Le reazioni avverse perdita di appetito, vomito, diarrea, sangue occulto nelle feci, letargia ed insufficienza renale sono state riportate non comunemente.

In casi molto rari sono stati riscontrati diarrea emorragica, ematemesi, ulcere gastrointestinali ed enzimi epatici aumentati.

Questi effetti collaterali si manifestano generalmente entro le prime due settimane di trattamento e nella maggior parte dei casi sono transitori e scompaiono al termine del trattamento, ma in casi molto rari possono essere gravi o fatali.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse, il trattamento deve essere interrotto e si deve consultare il medico veterinario.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

### **7 SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

### **8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Per somministrazione orale

Posologia:

Il trattamento iniziale è di una dose singola di 0,2 mg di meloxicam/kg di peso corporeo il primo giorno, che può essere data per via orale o in alternativa utilizzando Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile.

Si deve continuare il trattamento una volta al giorno con somministrazione orale (a intervalli di 24 ore) alla dose di mantenimento di 0,1 mg di meloxicam/kg di peso corporeo.

Ogni compressa masticabile contiene 1 mg oppure 2,5 mg di meloxicam, che corrisponde alla dose giornaliera di mantenimento per un cane del peso corporeo rispettivamente di 10 kg o di 25 kg.

Ogni compressa masticabile può essere divisa a metà per un dosaggio accurato secondo il peso corporeo individuale del cane.

Metacam compresse masticabili può essere somministrato con o senza cibo, è aromatizzato ed è assunto volontariamente dalla maggior parte dei cani.

Schema posologico per la dose di mantenimento:

Peso corporeo (kg)	Numero di compresse masticabili		mg/kg
	1 mg	2,5 mg	
4,0–7,0	½		0,13–0,1
7,1–10,0	1		0,14–0,1
10,1–15,0	1½		0,15–0,1
15,1–20,0	2		0,13–0,1
20,1–25,0		1	0,12–0,1
25,1–35,0		1½	0,15–0,1
35,1–50,0		2	0,14–0,1

Si può prendere in considerazione l'utilizzo di Metacam sospensione orale per cani per un dosaggio ancora più preciso. Per cani di peso inferiore a 4 kg si raccomanda l'utilizzo di Metacam sospensione orale per cani.

Una risposta clinica è normalmente riscontrata entro 3-4 giorni. Il trattamento deve essere sospeso dopo 10 giorni al massimo, se non sono evidenti miglioramenti clinici.

### **9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Si deve porre particolare attenzione all'accuratezza del dosaggio. **Seguire attentamente le istruzioni del medico veterinario.**

Istruzioni per aprire i blister a prova di bambino: Premere la compressa per rilasciarla dal blister.

### **10 TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

### **11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non usare più questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

## 12 AVVERTENZE SPECIALI

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Poiché le compresse hanno un sapore molto buono per i cani, c'è il rischio che le cerchino appositamente e le ingeriscano eccessivamente. Le compresse masticabili devono quindi essere tenute fuori dalla portata degli animali.

Un'adeguata assunzione di liquidi deve essere assicurata durante il trattamento. I trattamenti prolungati devono essere eseguiti sotto controllo dell'emocromo.

Evitare l'uso in animali disidratati, ipovolemici o ipotesici, poiché vi è un potenziale rischio di tossicità renale.

Come per tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei, il trattamento degli animali senili è associato a un aumento del rischio. Se l'uso in tali animali non può essere evitato, questo deve essere fatto sotto stretta osservazione clinica.

Questo prodotto per cani non deve essere utilizzato nei gatti in quanto non è adatto all'impiego in questa specie. Nei gatti, si deve utilizzare Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità ai farmaci antinfiammatori non steroidei devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

### Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Vedere paragrafo "Controindicazioni".

### Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

L'associazione di Metacam compresse masticabili con certi altri medicinali (veterinari) può portare ad effetti tossici. Questo medicinale veterinario non deve essere somministrato contemporaneamente ad altri farmaci antinfiammatori (farmaci antinfiammatori non steroidei o glucocorticosteroidi).

La somministrazione contemporanea di preparati potenzialmente dannosi per i reni dovrebbe essere evitata.

Una precedente terapia con sostanze antinfiammatorie può comportare una maggiore incidenza o gravità delle reazioni avverse. Di conseguenza, prima di iniziare il trattamento con Metacam, si deve osservare un periodo di almeno 24 ore in cui questi medicinali non vengano somministrati.

Comunque, per la durata del periodo di non somministrazione il veterinario deve tenere conto delle proprietà farmacologiche dei prodotti usati in precedenza.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di sovradosaggio il veterinario deve ricorrere ad un trattamento sintomatico.

**13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL  
PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

04.11.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15 ALTRE INFORMAZIONI**

Metacam 1 mg compresse masticabili per cani: scatola di 84 compresse in blister alu/alu

Metacam 2,5 mg compresse masticabili per cani: scatola di 84 compresse in blister alu/alu

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 57710

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.