

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO Pyrogenium compositum ad us. vet., soluzione Medicamento omeopatico

Bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani, gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: SaluVet GmbH, D-88339 Bad Waldsee

Distribuzione: ufamed AG, 6210 Sursee

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Pyrogenium compositum ad us. vet., soluzione

Medicamento omeopatico

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Principi attivi:

10 g (10,2 ml) contenuti nella soluzione

Pyrogenium-Nosode (HAB) D15 3,3 g

Lachesis (HAB) D8 (HAB 5 a) 3,3 g

Argentum metallicum (HAB) D30 3,3 g

Soluzione chiara, incolore

4. INDICAZIONE(I)

Medicamento omeopatico per iniezione sottocutanea e somministrazione orale

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici dei singoli rimedi contenuti, Pyrogenium compositum ad us. vet può essere utilizzato su prescrizione medica e in base ai consigli del medico veterinario per stimolare l'autoguarigione.

5. CONTROINDICAZIONI

Non note

6. EFFETTI COLLATERALI

Nota: durante il trattamento con un medicamento omeopatico, le condizioni attuali possono peggiorare temporaneamente (peggioramento iniziale). In questo caso interrompere la somministrazione del medicamento e chiedere consiglio al medico veterinario.

Nel caso in cui l'animale presenti un effetto collaterale che non è riportato nel foglietto illustrativo, informare il medico veterinario o il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, cavalli, maiali, pecore, capre, cani, gatti

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Iniezione sottocutanea		Somministrazione orale con il cibo o l'acqua	
Bovini	10 ml s.c.	Bovini	2,0 ml p.o.
Vitelli	5 ml s.c.	Vitelli	1,0 ml p.o.
Equini	10 ml s.c.	Equini	2,0 ml p.o.
Puledri	5 ml s.c.	Puledri	1,0 ml p.o.
Suini	5 ml s.c.	Suini	1,0 ml p.o.
Suinetti	1 ml s.c.	Suinetti	0,5 ml p.o.
Ovini	5 ml s.c.	Ovini	1,0 ml p.o.
Agnelli	2 ml s.c.	Agnelli	0,5 ml p.o.
Caprini	5 ml s.c.	Caprini	1,0 ml p.o.
Cani	1 ml s.c.	Cani	0,5 ml p.o.
Gatti	1 ml s.c.	Gatti	0,5 ml p.o.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

L'iniezione viene effettuata 1x (3x per i casi acuti) al giorno, mentre la somministrazione per via orale, meglio se con l'uso di pane, 2x (4x per i casi acuti) al giorno.

Ripetere la dose solo dopo il miglioramento a distanza di 1 – 2 giorni (iniezione 1x al giorno, somministrazione per via orale 2x al giorno)! In totale il medicamento non deve essere utilizzato oltre i 5 – 7 giorni.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Tempi di attesa: nessuno

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

In caso di malattie che necessitano di un trattamento chirurgico, Pyrogenium compositum ad us. vet. può essere utilizzato solo come trattamento di sostegno.

L'utilizzo del medicamento non sostituisce altri medicinali e misure adeguati al grado di gravità della malattia.

Nel caso dei sintomi seguenti, è consigliabile modificare il piano terapeutico e consultare un medico veterinario perché può trattarsi di una malattia che necessita di un trattamento antibiotico (topico) o chirurgico: ipertrofia linfonodale manifesta, suppurazioni estese e persistenti, condizioni febbrili pericolose e febbre che dura oltre 3 giorni, segni evidenti di infiammazione come arrossamento, zone calde, gonfiore, dolore e disturbi funzionali, grave peggioramento delle condizioni generali, disturbi non chiari, ricorrenti o di nuova insorgenza.

Gravidanza e allattamento:

Anche i medicinali omeopatici devono essere assunti durante la gravidanza e l'allattamento dopo aver consultato il medico veterinario.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

16.12.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con un flacone di vetro ambrato da 100 ml

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 57805

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1 o l'azienda di distribuzione.