

Norocarp® 20 mg ad us. vet., comprimés
Norocarp® 50 mg ad us. vet., comprimés
Norocarp® 100 mg ad us. vet., comprimés

Anti-inflammatoire non stéroïdien pour chiens

Composition

Norocarp® comprimés 20 mg:
Carprofenum 20 mg, Excip. pro compr.

Norocarp® comprimés 50 mg:
Carprofenum 50 mg, Excip. pro compr.

Norocarp® comprimés 100 mg:
Carprofenum 100 mg, color.: E102 Excip. pro compr.

Propriétés / Effets

Le carprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ayant des propriétés analgésiques et antipyrétiques.

Comme la plupart des autres AINS, le carprofène inhibe la cyclo-oxygénase. Mais aux doses thérapeutiques chez le chien, l'inhibition est faible, ce qui pourrait expliquer la bonne tolérance gastro-intestinale et rénale des comprimés de Norocarp®.

Pharmacocinétique

Après administration orale, le carprofène est très rapidement absorbé. Des concentrations sanguines élevées de carprofène sont atteintes 30 minutes seulement après administration. Chez le chien, la demi-vie est d'env. 8 heures. L'excrétion biliaire est prédominante, une faible proportion étant éliminée par voies urinaires. Lors d'une administration selon le schéma recommandé, on n'observe aucune accumulation de carprofène, car 97 à 98 % du principe actif est éliminé dans les 24 heures.

Indications

Diminution de l'inflammation et soulagement de la douleur en cas de maladies aiguës ou chroniques de l'appareil moteur (arthrose, polyarthrite rhumatoïde, spondylite), ainsi qu'un allongement de la couverture analgésique postopératoire.

Posologie / Mode emploi

Administration par voie orale.

Posologie: 4 mg de carprofène par kg de poids corporel une fois par jour ou répartis en deux doses fractionnées égales (correspondant à 1 comprimé Norocarp® 20 mg pour 5 kg de poids corporel ou 1 comprimé Norocarp® 50 mg pour 12,5 kg de poids corporel ou 1 comprimé Norocarp® 100 mg pour 25 kg de poids corporel).

La durée du traitement dépend de l'évolution clinique de la maladie et des indications du vétérinaire. Un traitement à long terme doit se faire sous contrôle régulier d'un vétérinaire. En l'absence d'amélioration après 14 jours, il convient de réévaluer le cas. Norocarp® comprimés peuvent être utilisés pour prolonger la couverture analgésique et anti-inflammatoire d'un traitement parentéral initié en période postopératoire. La posologie est de 4 mg/kg de poids corporel par jour pendant 5 jours.

Limitations d'emploi

a. Contre-indications

En l'absence de données, l'administration du carprofène aux chiennes gestantes est déconseillée. Le carprofène ne doit pas être administré aux chiens souffrant de problèmes rénaux, hépatiques ou cardiaques ou chez des chiens souffrant

d'ulcérations ou de saignements gastro-intestinaux, ainsi qu'en cas d'hypersensibilité au produit.

Ne pas administrer à des chiens déshydratés, hypovolémiques et hypotendus en raison du risque accru de toxicité rénale.

Comme pour d'autres AINS, on observe l'apparition de troubles hépatiques et rénaux isolés. Les AINS peuvent inhiber la phagocytose, c'est pourquoi il est conseillé d'administrer un traitement adjuvant dans le traitement antimicrobien en cas des infections bactériennes.

L'utilisation de Norocarp® comprimés est contre-indiquée chez les chats.

L'utilisation chez des très jeunes animaux ou chez des animaux âgés est associée à un risque accru. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à un examen minutieux et, le cas échéant, de réduire la dose.

b. Précautions

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Effets indésirables

Des effets typiques des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) tels que vomissements, selles molles/diarrhées, sang occulte dans les selles, perte d'appétit et apathie, ont été rapportés.

Ces effets indésirables surviennent généralement au cours de la première semaine de traitement. Dans la plupart des cas, ils sont transitoires et diminuent progressivement après interruption du traitement, mais dans de très rares cas ils peuvent aussi être graves ou engager le pronostic vital.

Comme pour d'autres AINS, des effets indésirables rénaux ou hépatiques idiosyncrasiques peuvent survenir dans de rares cas.

Lors de la survenue d'effets indésirables, il faut suspendre l'utilisation du médicament vétérinaire et demander conseil au vétérinaire.

Interactions

Ne pas administrer d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens simultanément ou dans les 24 heures, ni de médicaments néphrotoxiques ou à forte liaison aux protéines plasmatiques.

Remarques particulières

À conserver à une température inférieure à 25°C, au sec et à l'abri de la lumière. Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption imprimée sur l'emballage avec la mention «Exp». Tenir hors de la portée des enfants.

Numéro d'autorisation

Swissmedic Nr. 58'227

Catégorie de vente: B

ATCvet: QM01AE91

Présentation

Norocarp® 20 mg ad us. vet., comprimés:

Norocarp® 50 mg ad us. vet., comprimés:

Norocarp® 100 mg ad us. vet., comprimés:

Emballages de 100 comprimés (10 blisters)

Titulaire de l'autorisation:

ufamed SA, 6210 Sursee

Date de mise à jour de l'information

Septembre 2011

003679103