

# CANIDRYL FLAVOUR 100 mg ad us. vet.

## Teilbare Tabletten für Hunde Carprofenum

### Packungsbeilage

#### Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe  
[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

#### 1. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

##### Zulassungsinhaber:

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern  
Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:  
Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd., Loughrea,  
Co.Galway, Irland

#### 2. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Canidryl flavour 100 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde

#### 3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 Tablette enthält:

**Wirkstoff:** Carprofen 100 mg

Weisse bis cremefarbene runde Tabletten mit einer kreuzförmigen Bruchrille auf einer Seite

Die Tabletten können halbiert oder geviertelt werden.

#### 4. Anwendungsgebiete

Nichtsteroidaler Entzündungshemmer für Hunde  
Canidryl flavour Tabletten sind angezeigt zur Schmerzbekämpfung, insbesondere nach einer Operation, sowie zur Behandlung von Entzündungen des Bewegungsapparates gemäss Anweisung des Tierarztes.

#### 5. Gegenanzeigen

Carprofen sollte nicht an Hunde mit eingeschränkter Herz-, Leber- oder Nierenfunktion oder an Hunde mit Blutungen oder Geschwüren im Magen-Darmtrakt verabreicht werden.

Aufgrund eines erhöhten Risikos einer Nierenschädigung soll die Anwendung bei Hunden mit zu geringer Aufnahme bzw. zu hohen Verlusten an Flüssigkeit, mit erniedrigtem Blutvolumen und mit tiefem Blutdruck vermieden werden. Nicht bei Katzen anwenden.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

#### 6. Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann Canidryl flavour zu Symptomen wie Erbrechen, weichem Kot/Durchfall, Blut im Kot, Appetitverlust und Trägheit durch Geschwüre im Magen-Darmtrakt führen. Nieren- oder Leberstörungen können selten auftreten.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermassen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1'000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10'000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10'000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

#### 7. Zieltierart

Hund

#### 8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

2 bis 4 mg Carprofen/kg KGW täglich zum Eingeben ins Maul. Die Tagesdosis kann als Einzeldosis oder aufgeteilt in zwei gleiche Dosen verabreicht werden. Nach 7 Tagen kann die Dosierung eventuell auf 2 mg/kg KGW einmal täglich reduziert werden. Die Behandlungsdauer hängt vom Therapieerfolg ab. Der Hund sollte jedoch spätestens 14 Tage nach Behandlungsbeginn nochmals vom Tierarzt untersucht werden. Halten Sie sich an die Anweisungen des Tierarztes.

#### 9. Hinweise für die richtige Anwendung

Tabletten können in Hälften oder Viertel geteilt werden, um eine genaue Dosierung zu gewährleisten.

Nicht benötigte Tablettenteile sollten wieder in die geöffnete Vertiefung der Blisterpackung gegeben, und innerhalb von 72 Stunden aufgebraucht werden. Tablettenteile sollten bei der nächsten Verabreichung verwendet werden.

Alle nach der letzten Verabreichung des Produkts verbleibenden geteilten Tabletten sollten entsorgt werden.

Um eine Tablette in Viertel zu teilen, legen Sie die Tablette mit der Bruchrille nach oben auf eine ebene Fläche und drücken Sie mit einem Daumen auf die Mitte.

Um eine Tablette in Hälften zu teilen, legen Sie die Tablette mit der Bruchrille nach oben auf eine ebene Fläche, halten Sie eine Hälfte der Tablette fest und drücken Sie die andere Hälfte nach unten.

#### 10. Wartezeiten

Nicht zutreffend

#### 11. Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C). Nicht benötigte Tablettenteile sollten wieder in die geöffnete Vertiefung der Blisterpackung gegeben werden. Blister in äusserer Verpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Haltbarkeit von geteilten Tabletten: 72 Stunden  
Das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

#### 12. Besondere Warnhinweise

##### Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Die angegebenen Dosierungen sollen nicht überschritten werden.

##### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Da die Tabletten den Hunden sehr gut schmecken, besteht die Gefahr, dass sie diese gezielt suchen und übermässig aufnehmen. Canidryl flavour Tabletten müssen darum ausserhalb der Reichweite der Tiere aufbewahrt werden.

Die Anwendung von Canidryl flavour bei Welpen, die weniger als 6 Wochen alt sind, oder bei sehr alten Tieren kann mit einem erhöhten Risiko verbunden sein; die Anwendung bei diesen Tieren darf deshalb nur unter strenger Kontrolle des Tierarztes erfolgen.

Bei infektiös bedingten Entzündungen wird der Tierarzt in der Regel gleichzeitig eine antibakterielle Therapie durchführen.

##### Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage vorzuzeigen. Nach dem Anfassen der Tabletten Hände waschen.

**Trächtigkeit und Laktation:** Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt.

##### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht gleichzeitig mit anderen nichtsteroidalen Entzündungshemmern verabreichen. Die gleichzeitige Anwendung potentiell nierschädigender oder stark proteingebundener Medikamente sollte ebenfalls vermieden werden. Carprofen darf nicht zusammen mit Glukokortikoiden verabreicht werden.

##### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Es gibt kein spezifisches Gegenmittel. Im Falle einer Überdosierung muss der Tierarzt eine den Symptomen entsprechende Therapie vornehmen.

#### 13. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

#### 14. Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

19.03.2020

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

#### 15. Weitere Angaben

Faltschachteln mit 100 Tabletten  
(10 x 10 Tabletten in Blistern)

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 58'549

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.