

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Xeden[®] Cat ad us. vet., comprimés sécables pour chats

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier.

Fabricant responsable de la libération des lots: Ceva Santé animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutière, 53950 Louverné (France).

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Xeden[®] Cat ad us. vet., comprimés sécables pour chats

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active:

Enrofloxacin 15 mg

comprimé beige oblong avec encoche de rupture.

Le comprimé peut être divisé en deux parts égales.

4. INDICATION(S)

Traitement des infections à germes sensibles à l'enrofloxacin chez le chat, en particulier infections des voies alimentaires, respiratoires et urogénitales, ainsi que de la peau, infections secondaires d'une blessure et otites externes.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer aux chats âgés de moins de 3 mois ou pesant moins d'1 kg. Lors de dosages élevés, une lésion du cartilage de conjugaison peut survenir pendant la période de croissance. Ne pas administrer chez les animaux souffrant de troubles convulsifs d'origine centrale. L'élimination de l'enrofloxacin en partie par voie rénale. Lors de lésions rénales existantes, il faut donc s'attendre, comme pour toutes les fluoroquinolones, à un retard de l'élimination.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des troubles gastro-intestinaux ont été observés dans de rares cas.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités).
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités).
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chat.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

A donner dans la gueule.

- 1 comprimé pour 3 kg de poids vif en une seule prise quotidienne,
- ou ½ comprimé pour 1.5 kg de poids vif en une seule prise quotidienne.

pendant 5 à 10 jours consécutifs .

En cas d'absence d'amélioration clinique au bout de la moitié du traitement, celui-ci doit être reconsidéré.

Nombre de comprimés par jour	Poids du chat (kg)
½	1 — < 2
1	2 — < 4
1½	4 — < 5
2	5 — < 6.5
2½	6.5 — < 8.5

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les comprimés aromatisés peuvent être administrés directement dans la gueule du chat ou peuvent être proposés avec la nourriture.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «Exp.».

Durée de conservation des demi-comprimés: 24 heures

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Xeden[®] Cat ne doit être administré qu'après confirmation bactériologique du diagnostic et après un test de sensibilité des germes impliqués.

Du fait de la possibilité du développement de résistances, Xeden[®] Cat, comme toutes les fluoroquinolones, ne doit pas être utilisé comme prophylaxie ou lors d'infections banales. La dose et la durée de traitement recommandées par le vétérinaire doivent être respectées. Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Gestation :

Les études cliniques menées chez les animaux de laboratoire (rat, chinchilla) n'ont pas mis en évidence d'effets foeto-toxiques après administration du principe actif de Xeden[®] Cat aux doses thérapeutiques recommandées.

Lactation :

Comme le principe actif du Xeden[®] Cat passe dans le lait, l'administration de la spécialité est contre-indiquée chez la femelle allaitante.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Ne pas associer à la théophylline.

L'administration simultanée de produits comportant des sels de magnésium ou d'aluminium peut diminuer l'absorption de l'enrofloxacin.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire :

Un dépassement de la dose recommandée chez le chat peut conduire à des effets rétinotoxiques allant jusqu'à la cécité.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

22.07.2020

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte contenant 1 ou 10 blisters de 12 comprimés chacun.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise A: remise sur ordonnance vétérinaire non renouvelable

Swissmedic 58'882

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.