

## INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Profender ad us. vet., compresse per cani

#### 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berna

Fabbricanti responsabili del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE – 24106 Kiel

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

F – 70200 Lure

#### 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Profender ad us. vet., compresse per cani

#### 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

##### Composizione:

1 compressa contiene:

##### Principi attivi:

Emodepside 10 mg, praziquantel 50 mg

Compresse marroni a forma di osso con un'incisione per il taglio su ogni lato.

Le compresse possono essere divise in due metà uguali.

#### **4 INDICAZIONE(I)**

Per cani colpiti simultaneamente da nematodi e cestodi o per cui sussiste il rischio di un'infestazione simultanea di nematodi e cestodi dei seguenti tipi:

- Ascaridi e determinate larve di ascaridi
- Ancilostomi
- Tricocefali e determinate larve di tricocefali
- Cestodi (tra cui tenie quali *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis* ed *Echinococcus granulosus*)

#### **5 CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare in cani di età inferiore a 12 settimane e di peso inferiore a 3 kg. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli ingredienti.

#### **6 EFFETTI COLLATERALI**

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10'000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate) si sono osservati leggeri disturbi gastrointestinali passeggeri (come salivazione, vomito, diarrea) e leggeri disturbi passeggeri del sistema nervoso (come tremore, difficoltà di coordinazione). In questi casi non sembra sia stata osservata la privazione di cibo necessaria. Inoltre, i sintomi di disturbi del sistema nervoso (ad es. convulsioni) possono essere più gravi nel caso di cani da pastore scozzesi, cani da pastore scozzesi Shetland e cani da pastore australiani con determinati difetti genetici. Non è noto un antidoto specifico.

In casi molto rari, possono verificarsi disturbi comportamentali come l'eccessivo stimolo a muoversi (iperattività).

In casi molto rari sono stati segnalati perdita di appetito, aumento della temperatura (ipertermia), svogliatezza e immobilità.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

#### **7 SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

## 8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Profender per cani viene somministrato con una dose minima di 1 mg emodepside/kg di peso corporeo e 5 mg praziquantel/kg di peso corporeo in base alla tabella di dosaggio.

È sufficiente un'applicazione singola per ogni trattamento.

Peso corporeo (kg)	Numero compresse Profender® ad us. vet., compresse per cani Profender® ad us. vet., compresse per cani 1  = 10kg
› 3 - 5	½
› 5 - 10	1
› 10 - 15	1½
› 15 - 20	2
› 20 - 25	2½
› 25 - 30	3
› 30 - 35	3 ½

Per cani più pesanti aggiungere ½ compressa ogni 5 kg in più di peso corporeo.

Da somministrare a cani con più di 12 settimane e di almeno 3 kg di peso corporeo. Le compresse Profender per cani sono aromatizzate al gusto di carne e solitamente sono ben accettate dai cani anche senza cibo aggiuntivo.

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

**Somministrare solo ad animali a digiuno.** Nel caso di somministrazione alla mattina, il cane deve digiunare durante la notte. Il cane può essere alimentato di nuovo non prima di quattro ore dopo il trattamento.

Le mezze compresse non utilizzate non possono essere conservate per un utilizzo successivo.

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura EXP sul contenitore.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Le mezze compresse non utilizzate non possono essere conservate per un utilizzo successivo.

## **12 AVVERTENZE SPECIALI**

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Dopo frequenti e ripetute applicazioni di medicinali per uso veterinario con classi di principi attivi simili contro l'infestazione da vermi, è possibile che i vermi sviluppino resistenza a tali principi attivi.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Somministrare solo ad animali a digiuno. Vedere la rubrica 8.

In presenza di un'infezione da tenia del cane, si consiglia un trattamento complementare contro pulci e mallofagi per prevenire una reinfezione, poiché questi parassiti possono trasportare il cestode.

Poiché il medicinale veterinario contiene sostanze aromatiche, vi è il rischio che cani e gatti cerchino specificatamente le compresse e ne assumano in misura eccessiva. Per questo motivo il preparato va conservato in un luogo irraggiungibile agli animali.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Lavarsi le mani dopo la somministrazione delle compresse.

Se il medicinale veterinario è stato ingerito per errore, in particolari se sono coinvolti bambini, va consultato un medico e va mostrato il foglietto illustrativo o l'etichetta.

L'echinococcosi (infezione da *Echinococcus multilocularis* o da *Echinococcus granulosus*) rappresenta un pericolo anche per l'uomo. Poiché l'echinococcosi è una malattia soggetta all'obbligo di denuncia all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), vanno osservate direttive particolari per quanto riguarda il trattamento, i controlli ulteriori e la protezione delle persone. Rivolgersi al proprio veterinario per ulteriori informazioni.

### Gravidanza e allattamento:

Può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

### Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Il trattamento in concomitanza con altri medicinali veterinari, ad esempio con certi altri principi attivi antiparassitari, potrebbe provocare interazioni. Le potenziali conseguenze di tali interazioni non sono state indagate. Rivolgersi alla propria veterinaria / al proprio veterinario per ulteriori informazioni a riguardo.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

A dosi fino a cinque volte superiori a quelle raccomandate, alcuni cani - a digiuno, come previsto - hanno mostrato brevi tremori muscolari, disturbi di coordinazione e apatia.

Nei cani da pastore scozzesi con un determinato difetto genetico è stata osservata la presenza occasionale di brevi e lievi tremori e/o di disturbi di coordinazione già dopo la somministrazione di un dosaggio doppio rispetto a quello raccomandato. Questi sintomi diminuiscono completamente senza trattamento. Se al cane viene dato cibo subito prima o subito dopo la somministrazione delle compresse, la frequenza e l'intensità di tali sintomi da sovradosaggio possono aumentare e, occasionalmente, causare vomito.

### **13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali veterinari non utilizzati o i materiali di scarto da essi derivanti devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti.

Le mezza compresse non utilizzate non devono essere conservate per un utilizzo successivo e devono essere smaltite correttamente.

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

14.01.2025

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 ALTRE INFORMAZIONI**

#### Profender per cani

Scatola da 4 compresse in blister di alluminio

Scatola da 24 compresse in blister di alluminio

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 60071 003 4 compresse

Swissmedic 60071 004 24 compresse

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.