INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.swissmedicinfo-pro.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Inflacam® 1 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens
Inflacam® 2,5 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Inflacam 1 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens
Inflacam 2,5 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé à mâcher contient:

Substance active:
Méloxicam 1 mg
Méloxicam 2,5 mg

Comprimé à mâcher
Comprimé rond, beige à jaune clair, avec une rainure de rupture sur une face

4 INDICATION(S)

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour chiens. Pour le traitement des affections aiguës et chroniques de l'appareil locomoteur, telles que les modifications de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux, les affections articulaires, les contusions, les entorses, les foulures, les boiteries et les processus inflammatoires douloureux de l'appareil locomoteur en général.

5 CONTRE-INDICATIONS

Les comprimés à mâcher Inflacam ne doivent pas être utilisés en cas de:

- hypersensibilité connue au méloxicam ou à l'un des excipients;
- les chiennes allaitantes ou gestantes;
- les animaux souffrant de troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux cliniquement manifestes, ainsi que les chiens chez lesquels il existe un risque d'ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie;
- les animaux présentant des troubles de la coagulation sanguine avérés; et
- les animaux âgés de moins de 6 semaines ou pesant moins de 4 kg.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Il faut s'attendre aux effets indésirables typiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens (surtout au cours des 5 à 14 premiers jours de traitement) tels que perte d'appétit, vomissements, diarrhée, selles goudronneuses, apathie et insuffisance rénale.
Ces effets indésirables sont dans la plupart des cas passagers et disparaissent à l'arrêt du traitement, mais peuvent dans certains cas être graves ou mettre la vie en danger s'ils ne sont pas pris en compte.

Si vous constatez des effets indésirables, en particulier ceux qui ne sont pas mentionnés dans la notice, chez l'animal traité, ou si vous pensez que le médicament vétérinaire n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, MODE ET DURÉE D'ADMINISTRATION

Dosage

Traitement initial

Dose unique de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids corporel.

Traitement d'entretien

Utiliser 0,1 mg de méloxicam par kg de poids corporel une fois par jour par voie orale à partir du 2^{e} jour (intervalle de 24 heures). Chaque comprimé à mâcher contient soit 1 mg soit 2,5 mg de méloxicam, ce qui correspond à la dose d'entretien quotidienne pour un chien de 10 kg ou de 25 kg.

Schéma posologique pour le traitement d'entretien:

Poids corporel en kg	Nombre de comprimés à mâcher par jour		mg/kg
	1 mg	2,5 mg	
4,0 – 7,0	½	-	0,13 – 0,1
7,1 – 10,0	1	-	0,14 – 0,1
10,1 – 15,0	1½	-	0,15 – 0,1
15,1 – 20,0	2	-	0,13 – 0,1
20,1 – 25,0	-	1	0,12 – 0,1
25,1 – 35,0	-	1½	0,15 – 0,1
35,1 – 50,0	-	2	0,14 – 0,1

Un dosage plus précis peut être effectué en utilisant Inflacam 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens. Chez les chiens dont le poids corporel est inférieur à 4 kg, Inflacam 1,5 mg/ml suspension orale pour

chiens doit être utilisé. Une réponse clinique est généralement observée dans les 3 à 4 jours. Si aucune amélioration clinique n'est observée après 10 jours, le traitement doit être interrompu.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour un dosage correct, le poids corporel doit être déterminé le plus précisément possible afin d'éviter un sous-dosage ou un surdosage.
Les comprimés à mâcher peuvent être divisés en deux pour obtenir un dosage exact correspondant au poids corporel de l'animal. Les comprimés à mâcher peuvent être administrés avec ou sans nourriture et sont généralement ingérés volontairement par les chiens.
Veuillez suivre attentivement les instructions de votre vétérinaire.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).
Ne pas utiliser le médicament vétérinaire après la date de péremption indiquée sur le récipient avec «EXP».

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:
Il convient de veiller à une hydratation suffisante pendant le traitement. Les traitements prolongés doivent être effectués sous contrôle de l'état sanguin. Ne pas utiliser chez les animaux présentant une déshydratation, une diminution du volume sanguin et une pression artérielle basse, en raison d'un risque potentiel de lésions rénales.
Ce produit pour chiens ne doit pas être utilisé chez les chats, car il n'est pas adapté à cette espèce. Chez les chats, il convient d'utiliser la préparation Inflacam 0,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chats, qui est autorisée pour cette espèce animale.
Comme les comprimés sont très savoureux pour les chiens, il existe un risque qu'ils les recherchent de manière ciblée et les ingèrent de manière excessive. Les comprimés à mâcher doivent donc être tenus hors de portée des animaux.
Comme avec tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le traitement d'animaux affaiblis par l'âge est associé à un risque accru. Si l'utilisation chez de tels animaux ne peut être évitée, elle doit se faire sous surveillance clinique étroite.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:
Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.
En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

Gestation et lactation:
L'innocuité du médicament vétérinaire pendant la gestation et la lactation n'a pas été établie (voir rubrique 5 contre-indications).

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:
L'association de comprimés à mâcher Inflacam avec certains autres médicaments (vétérinaires) peut provoquer des intoxications. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être administré en même temps q autres anti-inflammatoires (anti-inflammatoires non stéroïdiens ou glucocorticoïdes). L'administration simultanée de préparations potentiellement nocives pour les reins doit être évitée.
Un traitement préalable par des substances anti-inflammatoires peut entraîner des effets indésirables supplémentaires ou accrus. Il convient donc de respecter un délai d'attente d'au moins 24 heures avant de poursuivre le traitement avec ces produits. Pour déterminer le délai d'attente, le vétérinaire doit tenir compte des propriétés des produits administrés précédemment.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):
En cas de surdosage accidentel, le vétérinaire doit traiter les symptômes.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

22.11.2022
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.swissmedicinfo-pro.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Inflacam 1 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens, boîte pliante de 20 comprimés à mâcher
Inflacam 1 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens, boîte pliante de 100 comprimés à mâcher
Inflacam 2,5 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens, boîte pliante de 20 comprimés à mâcher
Inflacam 2,5 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens, boîte pliante de 100 comprimés à mâcher

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 62532

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.