**INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI**

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito www.swissmedicinfo-pro.ch

# FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Inflacam® 1 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani
Inflacam® 2,5 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani

## 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

## 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Inflacam 1 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani
Inflacam 2,5 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani

## 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa masticabile contiene:

**Principio attivo:**
Meloxicam 1 mg
Meloxicam 2,5 mg

Compresse masticabili
Compressa rotonda di colore beige a giallo chiaro con un solco di rottura su un lato

## 4 INDICAZIONE(I)

Farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) per cani. Per il trattamento di malattie acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, come alterazioni della colonna vertebrale e dei dischi intervertebrali, patologie articolari, contusioni, distorsioni, stiramenti, zoppie e processi infiammatori dolorosi dell'apparato muscolo-scheletrico in generale.

## 5 CONTROINDICAZIONI

Inflacam compresse masticabili non deve essere usato nei seguenti casi:

- ipersensibilità nota al meloxicam o a uno qualsiasi degli eccipienti;
- cagne in allattamento o in gravidanza;
- animali con disturbi cardiaci, epatici o renali clinicamente manifesti e nei cani con possibilità di ulcere gastrointestinali o emorragie;
- animali con comprovati disturbi della coagulazione del sangue;
- animali di età inferiore alle 6 settimane o di peso inferiore ai 4 kg.

## 6 EFFETTI COLLATERALI

Gli effetti collaterali tipici dei farmaci antinfiammatori non steroidei (soprattutto nei primi 5 – 14 giorni di trattamento), come perdita di appetito, vomito, diarrea, feci catramose, svogliatezza e insufficienza renale, sono possibili.
Nella maggior parte dei casi, questi effetti collaterali sono temporanei e si attenuano dopo l'interruzione del trattamento, ma in singoli casi possono essere gravi o pericolosi per la vita se non vengono osservati.

Se si verificano effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, il trattamento deve essere interrotto e deve essere consultato una veterinaria / un veterinario. Se si sospetta che il medicamento veterinario non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria / il veterinario.

## 7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

## 8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, MODALITÀ E DURATA DI SOMMINISTRAZIONE

***Dosaggio***
*Trattamento iniziale*
Dose singola di 0,2 mg di meloxicam per kg di peso corporeo.

*Terapia di mantenimento*
Dal giorno 2, utilizzare 0,1 mg di meloxicam per kg di peso corporeo per via orale una volta al giorno (intervallo di 24 ore). Ogni compressa masticabile contiene 1 mg o 2,5 mg di meloxicam, che corrisponde alla dose giornaliera di mantenimento per un cane di 10 kg o 25 kg.

***Regime di dosaggio per la terapia di mantenimento:***

| Peso corporeo in kg | Numero di compresse masticabili al giorno | | mg/kg |
|---|---|---|---|
| | 1 mg | 2,5 mg | |
| 4,0 – 7,0 | ½ | - | 0,13 – 0,1 |
| 7,1 – 10,0 | 1 | - | 0,14 – 0,1 |
| 10,1 – 15,0 | 1½ | - | 0,15 – 0,1 |
| 15,1 – 20,0 | 2 | - | 0,13 – 0,1 |
| 20,1 – 25,0 | - | 1 | 0,12 – 0,1 |
| 25,1 – 35,0 | - | 1½ | 0,15 – 0,1 |
| 35,1 – 50,0 | - | 2 | 0,14 – 0,1 |

Un dosaggio più preciso può essere fornito quando si utilizza Inflacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani. Inflacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani deve essere utilizzato nei cani di peso inferiore ai 4 kg. La risposta clinica si verifica solitamente entro 3-4 giorni. Se non si riscontra alcun miglioramento clinico dopo 10 giorni, il trattamento deve essere interrotto.

## 9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per un dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile per evitare un sottodosaggio o un sovradosaggio.
Per un dosaggio esatto in base al peso corporeo dell'animale, le compresse masticabili possono essere dimezzate. Le compresse masticabili possono essere somministrate con o senza cibo e di solito vengono assunte volontariamente dai cani.
Seguire attentamente le istruzioni della veterinaria / del veterinario.

## 10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura «EXP».

## 12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali:
Durante il trattamento è necessario garantire un'adeguata assunzione di liquidi. I trattamenti prolungati devono essere eseguiti sotto controllo dello stato ematico. Non utilizzare in animali con carenza di liquidi, volume ematico ridotto e bassa pressione sanguigna, poiché esiste il rischio di danni ai reni.
Questo prodotto per cani non deve essere utilizzato nei gatti perché non è adatto a questa specie. Nei gatti si deve utilizzare il preparato Inflacam 0,5 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per gatti, approvato per questa specie.
Poiché le compresse hanno un sapore molto gradevole per i cani, c'è il rischio che le cerchino e le ingeriscano in modo eccessivo. Le compresse masticabili devono quindi essere tenute fuori dalla portata degli animali.
Come per tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei, il trattamento di animali anziani è associato a un aumento del rischio. Se non è possibile evitare l'uso in tali animali, questo deve avvenire sotto stretta osservazione clinica.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Le persone con ipersensibilità nota ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) devono evitare il contatto con il medicamento veterinario.
In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento:
La sicurezza del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita (vedere paragrafo 5 Controindicazioni).

Interazione con altri medicamenti e altre forme d'interazione:
La combinazione di Inflacam compresse masticabili con alcuni altri medicamenti (veterinari) può portare all'avvelenamento. Questo medicamento veterinario non deve essere somministrato insieme ad altri farmaci antinfiammatori (farmaci antinfiammatori non steroidei o glucocorticoidi). Si deve evitare la somministrazione contemporanea di preparati potenzialmente dannosi per i reni.
Il pretrattamento con sostanze antinfiammatorie può causare effetti collaterali aggiuntivi o maggiori. Pertanto è necessario osservare un periodo libero dal trattamento di almeno 24 ore, prima di un ulteriore trattamento con questi agenti. Nel determinare la durata del periodo senza trattamento, la veterinaria / il veterinario deve tenere conto delle proprietà dei preparati precedentemente somministrati.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):
In caso di sovradosaggio accidentale, la veterinaria / il veterinario deve trattare i sintomi.

## 13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## 14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

22.11.2022
Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.swissmedicinfo-pro.ch.

## 15 ALTRE INFORMAZIONI

Inflacam 1 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani, scatola pieghevole con 20 compresse masticabili
Inflacam 1 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani, scatola pieghevole con 100 compresse masticabili
Inflacam 2,5 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani, scatola pieghevole con 20 compresse masticabili

Inflacam 2,5 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani, scatola pieghevole con 100 compresse masticabili
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 62532

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell’omologazione indicato nella rubrica 1.