

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.swissmedicinfo-pro.ch](http://www.swissmedicinfo-pro.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Carprox<sup>®</sup> 20 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

Carprox<sup>®</sup> 50 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

Carprox<sup>®</sup> 100 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

#### 1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

#### 2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Carprox<sup>®</sup> 20 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

Carprox<sup>®</sup> 50 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

Carprox<sup>®</sup> 100 mg ad us. vet., comprimés pour chiens

#### 3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient: **Substance active:**

Carprox 20 mg 20 mg de Carprofène

Carprox 50 mg 50 mg de Carprofène

Carprox 100 mg 100 mg de Carprofène

Comprimé rond, brun foncé, avec une rainure sur une face.

#### 4 INDICATION(S)

Anti-inflammatoire pour chiens.

Les comprimés Carprox sont indiqués pour lutter contre la douleur, notamment après une opération, ainsi que pour le traitement des inflammations aiguës ou chroniques de l'appareil locomoteur, conformément aux instructions du vétérinaire.

#### 5 CONTRE-INDICATIONS

Le carprofène ne doit pas être utilisé chez les animaux dont la fonction rénale, hépatique ou cardiaque est altérée, ni chez les animaux présentant des ulcères ou des saignements dans le tractus gastro-intestinal.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des autres ingrédients.

Ne pas utiliser chez les chiennes en gestation ou en lactation.

Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 4 mois.



Ne pas utiliser chez les chats.

En raison d'un risque accru de lésions rénales, l'utilisation doit être évitée chez les chiens dont l'absorption est trop faible ou qui perdent trop de liquide, dont le volume sanguin est abaissé et dont la tension artérielle est basse.

Ne pas utiliser le produit immédiatement après un traitement préalable avec d'autres anti-inflammatoires et ne pas l'utiliser simultanément avec de telles substances actives. La durée d'une pause dans le traitement doit être déterminée par le vétérinaire en fonction des médicaments vétérinaires utilisés précédemment.

## 6 EFFETS INDÉSIRABLES

Des effets indésirables tels que vomissements, consistance molle des selles/diarrhée, sang non visible dans les selles, perte d'appétit et abattement ont été rapportés. Ces effets indésirables apparaissent généralement au cours de la première semaine de traitement et sont, dans la plupart des cas, transitoires et disparaissent à l'arrêt du traitement. Dans de très rares cas (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés), ils peuvent être graves ou mortels.

Si des effets indésirables apparaissent, le traitement avec le produit doit être interrompu et un vétérinaire doit être consulté.

Comme avec d'autres anti-inflammatoires, il existe un risque d'effets indésirables sur la fonction rénale et hépatique.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## 7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens

## 8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

4 mg de carprofène/kg de poids corporel (PC) une fois par jour à administrer dans la gueule.

1 comprimé de 20 mg par 5 kg de PC

1 comprimé de 50 mg par 12,5 kg de PC

1 comprimé de 100 mg par 25 kg de PC

Si aucune amélioration n'est constatée après 14 jours, le cas doit être réévalué par un vétérinaire. Après une opération, le traitement pour lutter contre la douleur et l'inflammation peut être effectué avec des comprimés Carprox. La posologie est de 4 mg/kg de poids corporel par jour pendant 5 jours.

## 9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Aucune.

## 10 TEMPS D'ATTENTE



Sans objet.

## 11 **CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).

Protéger de la lumière.

À conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver les demi-comprimés dans une alvéole ouverte du blister et les utiliser dans les 24 heures.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP».

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

## 12 **MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Les doses indiquées ne doivent pas être dépassées.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il existe un risque que les chiens et les chats recherchent spécifiquement les comprimés et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, les comprimés de Carprox doivent être conservés hors de portée des animaux.

L'utilisation de Carprox comprimés chez les chiots de moins de 6 semaines ou chez les animaux très âgés peut être associée à un risque accru. L'utilisation chez ces animaux ne doit donc se faire que sous contrôle vétérinaire strict. Le cas échéant, une réduction de la dose peut s'avérer nécessaire sur les conseils d'un vétérinaire.

En cas d'inflammation d'origine infectieuse, le vétérinaire appliquera généralement en même temps un traitement par antibiotiques.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice d'emballage ou l'étiquette.

Se laver les mains après l'administration des comprimés.

Gestation et lactation:

L'innocuité du médicament vétérinaire pendant la gestation et la lactation n'a pas été établie.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Ne pas administrer en même temps que d'autres anti-inflammatoires, des médicaments potentiellement nocifs pour les reins ou fortement liés aux protéines (voir également la rubrique 5).

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Il n'existe pas d'antidote spécifique au carprofène. En cas de surdosage, un traitement de soutien général doit être mis en place par le vétérinaire.



**13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

24.05.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.swissmedicinfo-pro.ch](http://www.swissmedicinfo-pro.ch).

**15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Boîte pliante de 20, 50 ou 100 comprimés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 63228

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché désigné à la rubrique 1.

