

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.swissmedicinfo-pro.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Carprox[®] 20 mg ad us. vet., compresse per cani

Carprox[®] 50 mg ad us. vet., compresse per cani

Carprox[®] 100 mg ad us. vet., compresse per cani

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Carprox[®] 20 mg ad us. vet., compresse per cani

Carprox[®] 50 mg ad us. vet., compresse per cani

Carprox[®] 100 mg ad us. vet., compresse per cani

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene: **Principio attivo:**

Carprox 20 mg 20 mg di carprofene

Carprox 50 mg 50 mg di carprofene

Carprox 100 mg 100 mg di carprofene

Compressa rotonda di colore marrone scuro con un solco su un lato.

4 INDICAZIONE(I)

Antinfiammatorio per cani.

Le compresse di Carprox sono indicate per alleviare il dolore, soprattutto dopo un intervento chirurgico, e per il trattamento delle infiammazioni acute o croniche dell'apparato muscolo-scheletrico, secondo le indicazioni del veterinario.

5 CONTROINDICAZIONI

Il carprofene non deve essere utilizzato in animali con funzionalità renale, epatica o cardiaca compromessa o in animali con ulcere o emorragie nel tratto gastrointestinale.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o ad altri ingredienti.

Non utilizzare nelle cagne in gravidanza o in allattamento.

Non utilizzare nei cani di età inferiore ai 4 mesi.



Non utilizzare nei gatti.

A causa dell'aumento del rischio di danni renali, l'uso deve essere evitato nei cani con scarsa assunzione o elevate perdite di liquidi, basso volume di sangue e bassa pressione sanguigna.

Non utilizzare immediatamente dopo un pretrattamento con altri agenti antinfiammatori e non utilizzare contemporaneamente a tali agenti. La durata dell'interruzione del trattamento deve essere stabilita dal veterinario sulla base dei medicinali veterinari precedentemente utilizzati.

6 EFFETTI COLLATERALI

Sono stati segnalati effetti collaterali come vomito, consistenza fecale molle/diarrea, sangue non visibile nelle feci, perdita di appetito e depressione. Questi effetti collaterali si manifestano di solito entro la prima settimana di trattamento e nella maggior parte dei casi sono transitori e scompaiono dopo la fine della terapia. In casi molto rari (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate) possono essere gravi o fatali.

Se si verificano effetti collaterali, è necessario interrompere il trattamento con il prodotto e consultare un veterinario.

Come per altri farmaci antinfiammatori, esiste il rischio di effetti collaterali sulla funzionalità renale ed epatica.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, MODALITÀ E DURATA DI SOMMINISTRAZIONE

4 mg di carprofene/kg di peso corporeo (PC) una volta al giorno da somministrare per bocca.

1 compressa da 20 mg per 5 kg di PC

1 compressa da 50 mg per 12,5 kg di PC

1 compressa da 100 mg per 25 kg di PC

Se non si riscontrano miglioramenti dopo 14 giorni, il caso deve essere rivalutato da un veterinario. Dopo un'operazione, le compresse Carprox possono essere utilizzate per alleviare il dolore e per il trattamento antinfiammatorio. Il dosaggio è di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno per 5 giorni.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

10 TEMPO(I) DI ATTESA



Non pertinente.

11 **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C).

Proteggere dalla luce.

Conservare nella confezione originale.

Conservare le compresse dimezzate nell'alveolo aperto del blister e utilizzarle entro 24 ore.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura «EXP».

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

12 **AVVERTENZE SPECIALI**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

I dosaggi specificati non devono essere superati.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Poiché il medicamento veterinario è aromatizzato, esiste il rischio che cani e gatti cerchino le compresse e le ingeriscano in eccesso. Per questo motivo, le compresse di Carprox devono essere tenute fuori dalla portata degli animali.

L'uso di Carprox compresse in cuccioli di età inferiore alle 6 settimane o in animali molto anziani può essere associato a un aumento del rischio. Pertanto, deve essere utilizzato in questi animali solo sotto stretto controllo veterinario. Se necessario, la dose può essere ridotta su consiglio di un medico veterinario. In caso di infiammazione causata da un'infezione, la veterinaria / il veterinario di solito somministra contemporaneamente degli antibiotici.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Lavarsi le mani dopo aver somministrato le compresse.

Gravidanza e allattamento:

L'innocuità del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non somministrare contemporaneamente ad altri farmaci antinfiammatori, a farmaci che possono danneggiare i reni o a farmaci fortemente legati alle proteine (vedere anche rubrica 5).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non esiste un antidoto specifico per il carprofene. In caso di sovradosaggio, il veterinario deve somministrare una terapia di supporto generale.



**13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/o veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

24.05.2024

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.swissmedicinopro.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con 20, 50 o 100 compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 63228

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella rubrica 1.

