

Dolocarp® flavour ad us. vet., Kautabletten 20 mg / 50 mg / 100 mg

Nichtsteroidaler Entzündungshemmer für Hunde

| Zusammensetzung | 20 mg | 50 mg | 100 mg |
|--------------------------|-------|-------|--------|
| 1 Kautablette enthält: | | | |
| Wirkstoff: Carprofenum | 20 mg | 50 mg | 100 mg |
| Hilfsstoffe: Aromatica | | | |
| Excipients pro compresso | | | |

Eigenschaften / Wirkungen

Carprofen ist ein nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID) mit analgetischer und antipyretischer Wirkung. Carprofen hemmt die Cyclooxygenase. Die Hemmung ist beim Hund nach therapeutischer Dosierung von Carprofen jedoch minimal, so dass die Konzentration der Produkte der Cyclooxygenase (Prostaglandine und Thromboxane) und der Lipoxygenase (Leukotriene) praktisch unverändert bleibt. Dies ist eine mögliche Erklärung für die gute gastrointestinale und renale Verträglichkeit von Dolocarp flavour.

Der genaue Wirkungsmechanismus von Carprofen ist nicht bekannt.

Beim Hund zeigte Carprofen nach wiederholter Verabreichung während 8 Wochen in einem Osteoarthritis-Modell keinen negativen Effekt auf den chronisch arthritischen Knorpel. In vitro Studien deuten darauf hin, dass therapeutische Konzentrationen von Carprofen die Proteoglykansynthese in Chondrozyten, die von caninem arthritischem Knorpel isoliert wurden, steigern kann.

Pharmakokinetik

Carprofen wird nach peroraler Verabreichung sehr schnell absorbiert. Bereits nach 30 Minuten werden hohe Blutspiegel erreicht. Die Halbwertszeit beim Hund beträgt ca. 8 Stunden. Die Ausscheidung erfolgt überwiegend über die Galle. Ein kleiner Teil wird über den Harn ausgeschieden. Eine Kumulation von Carprofen bei vorschriftsgemässer Anwendung findet nicht statt, da nach 24 Stunden 97 - 98% ausgeschieden sind.

Indikationen

Die orale Anwendung von Carprofen ist hauptsächlich indiziert zur Behandlung von Entzündungen im Zusammenhang mit akuten oder chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Osteoarthritis). Zudem können Dolocarp flavour Kautabletten zur Verlängerung der postoperativen Analgesie eingesetzt werden.

Dosierung / Anwendung

4 mg Carprofen/kg KGW einmal täglich per os. Dolocarp flavour Kautabletten können dank Bruchrille in zwei gleichgrosse Hälften geteilt werden. Tritt nach 14 Tagen keine Besserung ein, ist der Fall neu zu beurteilen. Dolocarp flavour Kautabletten werden von den meisten Hunden freiwillig aufgenommen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man versuchen, die Tabletten mit dem Futter vermischt oder direkt ins Maul zu verabreichen.

Postoperativ kann nach adäquater parenteraler Behandlung die Analgesie und Entzündungshemmung mit Dolocarp flavour Kautabletten fortgesetzt werden. Die Dosierung beträgt 4 mg Carprofen/kg KGW pro Tag über 5 Tage.

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Die Anwendung bei trächtigen Hündinnen ist nicht untersucht und nicht angezeigt. Carprofen soll nicht bei Hunden mit eingeschränkter Nieren-, Leber- oder Herzfunktion oder Hunden mit gastrointestinalen Ulzerationen oder Blutungen eingesetzt werden. Ebenso kann die Anwendung bei dehydrierten oder hypovolämischen Hunden oder bei Tieren mit tiefem Blutdruck potentiell nephrotoxisch sein.

Die Verwendung von Dolocarp flavour Kautabletten bei Katzen ist kontraindiziert.

Vorsichtsmassnahmen

Die angegebene Dosierung sollte nicht überschritten werden.

Da die Tabletten den Hunden sehr gut schmecken, besteht die Gefahr, dass sie diese gezielt suchen und übermässig aufnehmen. Dolocarp flavour Kautabletten müssen darum ausserhalb der Reichweite der Tiere aufbewahrt werden.

Wird Carprofen bei Hunden, die weniger als 6 Wochen alt sind, oder bei alten Hunden angewendet,

müssen die Tiere sorgfältig überwacht werden. Die Dosis muss gegebenenfalls reduziert werden.

NSAIDs können im Zusammenhang mit Entzündungen infolge bakterieller Infektionen die Phagozytose hemmen. Eine antimikrobielle Begleittherapie ist dann angezeigt.

Unerwünschte Wirkungen

Wie bei anderen NSAIDs treten vereinzelt Leber- und Nierenstörungen auf.

In seltenen Fällen, insbesondere nach Überdosierung von Carprofen, können bei Hunden Ulzera im Magen-Darm-Trakt auftreten.

Wechselwirkungen

Nicht gleichzeitig mit anderen NSAIDs, nephrotoxischen oder stark an Proteine bindenden Medikamenten verabreichen.

Sonstige Hinweise

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Packung: 12 Monate

Haltbarkeit von halben Tabletten: 2 Tage

Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) und trocken aufbewahren. Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur bis zum mit «EXP.» bezeichneten Datum verwenden.

Packungen

20, 100 Kautabletten

Zulassungsinhaber
Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 63'250 (B)
ATCvet-Code QM01AE91

Stand der Information
Mai 2016