

Dolocarp® flavour ad us. vet., comp. à croquer 20 mg / 50 mg / 100 mg

Anti-inflammatoire non stéroïdien pour chiens

Composition	20 mg	50 mg	100 mg
1 comprimé à croquer contient:			
Principe actif: carprofenum	20 mg	50 mg	100 mg
Excipients: aromatica			
Excipients pro compresso			

Propriétés / Effets

Le carprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), doté de propriétés analgésiques et anti-pyrétiques. Le carprofène inhibe la cyclo-oxygénase. Cependant, aux doses thérapeutiques chez le chien, l'inhibition par le carprofène est faible, si bien que la concentration des produits de la cyclo-oxygénase (prostaglandines et thromboxanes) et de la lipoxigénase (leucotriènes) reste quasiment inchangée. Ceci pourrait expliquer la bonne tolérance gastro-intestinale et rénale de Dolocarp flavour. Le mode d'action précis du carprofène est mal connu à ce jour.

Après administration répétée pendant 8 semaines à des chiens atteints d'ostéo-arthrite, le carprofène n'a pas eu d'impact négatif sur l'usure chronique du cartilage. D'après les résultats d'études in vitro, il semblerait qu'aux concentrations thérapeutiques, le carprofène contribue à stimuler la synthèse des protéoglycanes au sein de chondrocytes isolés à partir du cartilage de chiens arthrosiques.

Pharmacocinétique

Après son administration orale, le carprofène est absorbé très rapidement. Après 30 minutes déjà, des taux sanguins élevés sont atteints. La demi-vie chez le chien est d'environ 8 heures. L'élimination se fait principalement par voie biliaire. Une petite fraction est éliminée dans les urines. Si l'administration se fait selon le schéma recommandé, il n'y a pas d'accumulation de carprofène dans l'organisme, étant donné que 97 - 98% est éliminé en 24 heures.

Indications

L'administration orale de carprofène est indiquée principalement pour le traitement de l'inflammation lors d'affections aiguës ou chroniques de l'appareil locomoteur (par ex. l'ostéo-arthrite).

Les comprimés à croquer Dolocarp flavour peuvent également être employés pour prolonger l'analgésie postopératoire.

Posologie / Mode d'emploi

4 mg de carprofène par kg de poids corporel une fois par jour par voie orale. Les comprimés à croquer Dolocarp flavour peuvent être divisés en deux moitiés égales grâce à leur rainure. Si aucune amélioration n'est observée après 14 jours de traitement, le patient doit être réexaminé. La plupart des chiens acceptent volontiers les comprimés à croquer Dolocarp flavour. Si ce n'est pas le cas, mélanger les comprimés à la ration ou les administrer directement au fond de la bouche.

En postopératoire, après un traitement parentéral approprié, l'analgésie et l'effet anti-inflammatoire peuvent être prolongés avec les comprimés à croquer Dolocarp flavour. Le dosage journalier est de 4 mg de carprofène par kg de poids corporel pendant 5 jours.

Limitations d'emploi

Contre-indications

L'utilisation chez la chienne en gestation n'a pas été étudiée et n'est pas indiquée. Le carprofène ne doit pas être utilisé chez les chiens atteints d'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque, ni chez les chiens souffrant d'ulcères ou de saignements gastro-intestinaux. L'utilisation chez des animaux déshydratés, souffrant d'hypovolémie ou d'hypotension peut avoir des effets néphrotoxiques.

L'utilisation de comprimés à croquer Dolocarp flavour chez les chats est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

Le dosage indiqué ne doit pas être dépassé.

En raison de la nature appétente des comprimés, il existe un risque que les chiens les recherchent activement et qu'ils les ingèrent en quantité excessive. Les comprimés à croquer Dolocarp flavour doivent donc être tenus hors de portée des animaux.

Si le carprofène est administré à des chiots de moins de 6 semaines ou à des chiens âgés, il convient de bien surveiller ces patients. Si nécessaire, le dosage doit être diminué.

Lors d'infections bactériennes associées à un état inflammatoire, les AINS peuvent inhiber la phagocytose. Un traitement antimicrobien concomitant est alors recommandé.

Effets indésirables

Comme pour tous les AINS, des troubles rénaux et hépatiques peuvent apparaître dans des cas isolés. Dans de rares cas, en particulier après un surdosage de carprofène, des ulcères gastro-intestinaux peuvent survenir chez les chiens.

Interactions

Ne pas administrer simultanément avec d'autres AINS ou avec des médicaments néphrotoxiques ou fortement liés aux protéines.

Remarques particulières

Durée de conservation après ouverture de l'emballage: 12 mois

Durée de conservation des demi-comprimés: 2 jours

Conserver à température ambiante (15 - 25°C) et dans un endroit sec. Tenir hors de portée des enfants.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec la mention «EXP.» sur l'emballage.

Présentations

20, 100 comprimés à croquer

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 63'250 (B)

ATCvet-Code QM01AE91

Mise à jour de l'information

Mai 2016

