

## INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Milpro™ Katze S ad us. vet., Filmtabletten

Milpro™ Katze M ad us. vet., Filmtabletten

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg  
Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: Virbac, 1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID, 06510 Carros, France

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Milpro Katze S ad us. vet., Filmtabletten

Milpro Katze M ad us. vet., Filmtabletten

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

##### Milpro Katze S ad us. vet., Filmtabletten

1 Filmtablette enthält:

##### **Wirkstoffe:**

Milbemycinoxim	4 mg
Praziquantel	10 mg

##### Milpro Katze M ad us. vet., Filmtabletten

1 Filmtablette enthält:

##### **Wirkstoffe:**

Milbemycinoxim	16 mg
Praziquantel	40 mg

Tablette zum Eingeben.

Milpro Katze S ad us. vet., Filmtablette: ovale, braune Tablette mit beidseitiger Bruchrille

Milpro Katze M ad us. vet., Filmtablette: ovale, rote bis pinkfarbene Tablette mit beidseitiger Bruchrille

#### **4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Tierarzneimittel mit Wirkung gegen ein breites Spektrum von Würmern.

Milpro Katze wird verwendet zur:

- Behandlung von Haken-, Rund- und Bandwurmbefall. Milpro ist ebenfalls wirksam gegen unreife und reife Stadien von *Echinococcus spp.*
- Vorbeugung der Herzwurmerkrankung (*Dirofilaria immitis*)

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Milpro Katze S: nicht bei Katzen unter 0,5 kg anwenden

Milpro Katze M: nicht bei Katzen unter 2 kg anwenden

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte), besonders bei jungen Katzen, können nach Verabreichung des Tierarzneimittels Überempfindlichkeitsreaktionen, Symptome wie eine ungewöhnlich stark ausgeprägte Schläfrigkeit, Symptome im Zusammenhang mit dem Nervensystem (wie gestörte Koordination von Bewegungen und Muskelzittern) und/oder Symptome des Magen-Darm-Trakts (wie Erbrechen und Durchfall) beobachtet werden.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

#### **7. ZIELTIERART(EN)**

Katze

#### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Minimale empfohlene Dosierung: 2 mg Milbemycinoxim und 5 mg Praziquantel pro kg Körpergewicht werden einmalig oral verabreicht.

Das Tierarzneimittel mit Futter oder direkt nach dem Füttern verabreichen. Milpro Katze sind einfach zu verabreichende Filmtabletten mit Geschmacksstoffen (kleine aromatisierte Tabletten).

In Abhängigkeit vom Körpergewicht der Katze erfolgt die praktische Dosierung wie folgt:

Körpergewicht	Milpro Katze S	Milpro Katze M
0,5 – 1 kg	½ Tablette	
> 1 – 2 kg	1 Tablette	
> 2 – 4 kg		½ Tablette
> 4 – 8 kg		1 Tablette
> 8 – 12 kg		1½ Tabletten

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Katzenwelpen werden im Alter von 6 Wochen und dann monatlich bis zum Alter von 6 Monaten entwurmt. Erwachsene Katzen sollen 4 mal pro Jahr entwurmt werden.

## 10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Raumtemperatur lagern (15 °C – 25 °C).

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Halbierte Milpro Katze Filmtabletten im geöffneten Blisterfach aufbewahren und innerhalb von 6 Monaten verwenden. Das Präparat darf nur bis zum mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Milpro Katze S: Minimalgewicht 0,5 kg

Milpro Katze M: Minimalgewicht 2 kg

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Gemäss guter tierärztlicher Praxis sollten die Tiere gewogen werden, um eine genaue Dosierung sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass Katzen und Katzenwelpen, die zwischen 0,5 kg und ≤ 2 kg wiegen, die korrekte Tablettenstärke (4 mg Milbemycinoxim / 10 mg Praziquantel) sowie die korrekte

Dosis (1/2 oder 1 Tablette) für die jeweilige Gewichtsklasse (1/2 Tablette für Katzen mit einem Gewicht von 0,5 bis 1 kg; 1 Tablette für Katzen mit einem Gewicht > 1 kg bis 2 kg) erhalten.

Es wird empfohlen, alle Tiere, die im selben Haushalt leben, gleichzeitig zu behandeln. Bei einer Bandwurm-Infektion mit *Dipylidium caninum* sollte in Absprache mit der Tierärztin / dem Tierarzt eine gleichzeitige Behandlung gegen Zwischenwirte wie Flöhe und Läuse in Betracht gezogen werden, um eine erneute Infektion zu verhindern.

Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender:

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein eine Ärztin / ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Trächtigkeit und Laktation:

Milpro Katze kann auch bei trächtigen und laktierenden Kätzinnen angewendet werden. Säugende Kätzinnen müssten gleichzeitig mit den Welpen behandelt werden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Nach Überdosierung können insbesondere bei jungen Tieren vorübergehend Weitstellung der Pupillen (Mydriasis), gestörte Koordination von Bewegungen (Ataxie) und Muskelzittern (Tremor) auftreten. Diese Symptome klingen ohne Behandlung innerhalb eines Tages ab.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz. Milpro Katze darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

#### **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

04.10.2024

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

#### **15. WEITERE ANGABEN**

##### Packungsgrößen:

Milpro Katze S: Faltschachteln mit 2, 4 und 24 Tabletten in einem Kunststoff-Aluminium Blister

Milpro Katze M: Faltschachteln mit 2, 4, 24 und 48 Tabletten in einem Kunststoff-Aluminium Blister

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic: 65'047

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.