

Efex 10 mg, Efex 40 mg, Efex 100 mg

ad. us. vet
Comprimés à croquer sécables
Antibiotique (inhibiteur de la gyrase) pour chiens et chats.

COMPOSITION

Principe actif : Marbofloxacinum 10 mg / 40 mg / 100 mg
Excipient : Aromatica
Excipients pro compresso

PROPRIÉTÉS/EFFETS

La marbofloxacinine est un antibiotique de synthèse avec une activité bactéricide, de la famille des fluoroquinolones, qui agit par inhibition de l'ADN-gyrase. Son spectre d'activité est large, orienté contre les bactéries Gram négatives ainsi que contre la plupart des mycoplasmes et des bactéries Gram positives (certains Streptocoques et Entérocoques peuvent être résistants). Les bactéries anaérobies, les levures et les champignons sont résistants à la marbofloxacinine.

PHARMACOCINÉTIQUE

Après administration par voie orale chez les chiens et les chats à la dose recommandée de 2 mg/kg, la marbofloxacinine est facilement absorbée et atteint les concentrations plasmatiques maximales de 1,5 µg/ml en 2 heures. Sa biodisponibilité est proche de 100%. Dans la plupart des tissus (peau, muscle, foie, rein, poumon, vessie, tractus digestif) ses concentrations sont supérieures à celle du plasma. La marbofloxacinine est éliminée lentement (demi-vie d'élimination de 14 h chez les chiens et de 10 h chez les chats), essentiellement sous forme active dans l'urine (2/3) et les fèces (1/3).

INDICATIONS

Infections à germes sensibles à la marbofloxacinine :

- Pyodermites superficielles et profondes chez le chat et le chien
- Infection bactérienne des voies respiratoires chez le chat et le chien
- Infection du tractus urinaire par *Proteus mirabilis* et *E. coli* chez le chien, associée ou non à une prostatite ou à une épididymite.

POSOLOGIE/MODE D'EMPLOI

La dose recommandée est de 2 mg/kg/j en une prise quotidienne unique :

Poids vif (kg)	Efex 10 mg*	Efex 40 mg*	Efex 100 mg*
1.0 - 2.5	½		
2.6 - 5.0	1	¼	
5.1 - 7.5	1 ½	½	
7.6 - 10.0	2	½	
10.1 - 15.0		¾	
15.1 - 20.0		1	½
20.1 - 25.0		1 ¼	½
25.1 - 30.0		1 ½	¾
30.1 - 35.0		1 ¾	¾
35.1 - 40.0		2	
37.6 - 50.0			1
50.1 - 62.5			1 ¼
62.6 - 75.0			1 ½
75.1 - 87.5			1 ¾
87.6 - 100.0			2

* Le tableau liste des conseils de dosages alternatifs. Exemple : un chien de 20 kg de poids vif peut être traité soit avec un comprimé entier d'Efex 40 mg, soit avec un demi comprimé d'Efex 100 mg.

Chiens

Lors de pyodermites : au moins 5 jours, jusqu'à 40 jours en fonction de l'évolution de la maladie.

Lors d'infections respiratoires aiguës : 7 jours, chroniques : 21 jours.

Lors d'infections urinaires sans prostatite ni épидидymite : au moins 10 jours, autres cas : 28 jours.

Chats

Lors d'infections de la peau et des tissus mous (plaies, abcès, phlegmons) : 3 à 5 jours.

Lors d'infections des voies respiratoires supérieures : 5 jours.

Un surdosage peut provoquer des signes aigus sous forme de troubles neurologiques, lesquels peuvent être traités de manière symptomatique.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Contre-indications :

La marbofloxacin ne devrait pas être utilisée chez des grands chiens de moins de 12 mois ou de moins de 18 mois pour les chiens de très grandes races, car il existe un risque de dégénérescence du cartilage articulaire.

Chez des races moyennes en croissance, la marbofloxacin est bien tolérée jusqu'à des doses de 6 mg/kg/j pendant 13 semaines. Ne pas utiliser chez les chats de moins de 16 semaines.

Les études menées sur les animaux de laboratoires (rat, lapins) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène, foetotoxique ou maternotoxique aux doses utilisées en thérapeutique. Cependant, aucune étude n'a été menée chez la chienne ou la chatte gestante ou allaitante. L'utilisation du médicament chez la femelle gestante ou allaitante sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

Les fluoroquinolones sont également connues pour leurs effets indésirables neurologiques

potentiels. La prudence est recommandée chez les chiens et les chats qui ont fait l'objet d'un diagnostic d'épilepsie.

Précautions :

Efex 10, 40, 100 mg ad us. vet., comprimés à croquer ne doit être utilisé qu'après confirmation du diagnostic bactériologique et test de sensibilité de l'agent pathologique en cause, et en présence d'une résistance à d'autres antibiotiques. L'utilisation d'Efex 10, 40, 100 mg ad us. vet. ne devrait pas avoir lieu en cas d'infections bénignes en raison du développement possible de résistances. Un pH urinaire bas peut avoir un effet inhibiteur sur l'activité de la marbofloxacin. Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

EFFETS INDÉSIRABLES

Dans des cas rares, des effets indésirables tels que des vomissements, un ramollissement des selles, une modification de la soif ou une augmentation de l'activité peuvent survenir. Ces effets indésirables disparaissent spontanément après le traitement.

INTERACTIONS

La biodisponibilité de la marbofloxacin peut se trouver diminuée par une administration orale simultanée de cations (aluminium, calcium, fer, magnésium). L'administration concomitante de théophylline requiert un suivi car les concentrations plasmatiques de théophylline peuvent augmenter.

REMARQUES PARTICULIÈRES

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C) dans l'emballage d'origine. Les fractions de comprimés doivent être conservées dans la plaquette thermoformée. Les fractions restantes doivent être éliminées après 72 heures.

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention « Exp ».

Swissmedic 65'261 (A)

ATCvet code : QJ01MA93

PRÉSENTATIONS

Efex 10 mg : boîte de 1 x 10 ou 12 x 10 comprimés à croquer sécables.

Efex 40 mg : boîte de 1 x 8 ou 15 x 8 comprimés à croquer sécables.

Efex 100 mg : boîte de 1 x 6 ou 20 x 6 comprimés à croquer sécables.

Titulaire de l'autorisation Biokema SA, Crissier-Lausanne

Mise à jour de l'information Août 2014