

## INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito  
[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

LOXICOM® 1 mg ad.us.vet., compresse masticabili per cani

LOXICOM® 2.5 mg ad us vet., compresse masticabili per cani

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

ufamed AG, Kornfeldstrasse 2, CH-6210 Sursee

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Norbrook Laboratories Ltd., Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland

#### 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Loxicom® 1 mg ad.us.vet., compresse masticabili per cani

Loxicom® 2.5 mg ad us vet., compresse masticabili per cani

#### 3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Ogni compressa masticabile contiene:

**Principio attivo:**

Meloxicam 1 mg

Meloxicam 2.5 mg

Compresse ovali marrone chiaro biconvesse, con una tacca su una faccia e lisce sull'altra.

Le compresse possono essere suddivise in due parti uguali.

#### 4. INDICAZIONE(I)

Attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici nel cane.

#### 5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali in gravidanza o in allattamento.

Non usare in animali affetti da disturbi gastrointestinali quali irritazione/ulcerazioni ed emorragie, con funzionalità epatica, cardiaca o renale danneggiate e con disturbi emorragici.

Non usare in cani con meno di 6 settimane di vita o del peso inferiore a 4 kg.

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

## 6. EFFETTI COLLATERALI

Sono state riportate occasionalmente reazioni avverse come perdita di appetito, vomito, diarrea, sangue nelle feci (feci nere), apatia ed insufficienza renale. In casi molto rari sono stati riportati diarrea emorragica, ematemesi, ulcere gastrointestinali ed enzimi epatici aumentati. Queste reazioni avverse si verificano generalmente entro la prima settimana di trattamento e nella maggior parte dei casi sono transitorie e scompaiono al termine del trattamento, ma in rarissimi casi possono essere gravi o fatali.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse, il trattamento deve essere interrotto e si deve consultare il medico veterinario.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1`000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10`000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10`000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

## 8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale.

Il trattamento iniziale è di una dose singola di 0.2 mg meloxicam/kg di peso corporeo il primo giorno. Si deve continuare una volta al giorno con somministrazione orale (a intervalli di 24 ore) alla dose di mantenimento di 0.1 mg di meloxicam/kg di peso corporeo. In alternativa, la terapia può iniziare con Loxicom soluzione iniettabile (contenente 5 mg/ml di meloxicam).

Ogni compressa masticabile contiene 1 mg o 2.5 mg di meloxicam, che corrispondono alla dose giornaliera di mantenimento rispettivamente per un cane di 10 kg o di 25 kg di peso vivo.

Ogni compressa può essere divisa in due parti uguali, per un preciso dosaggio in relazione al peso individuale di ciascun animale. Le compresse possono essere somministrate durante o lontano dai pasti, essi contengono sapori e sono assunte volontariamente dalla maggior parte dei cani.

*Schema per la dose di mantenimento:*

Peso vivo in kg	Numero di compresse masticabili 1 mg	Numero di compresse masticabili 2.5 mg	mg/kg
4.0 - 7.0	½		0.13 - 0.1
7.1 - 10.0	1		0.14 - 0.1
10.1 - 15.0	1 ½		0.15 - 0.1
15.1 - 20.0	2		0.13 - 0.1
20.1 - 25.0		1	0.12 - 0.1
25.1 - 35.0		1 ½	0.15 - 0.1
35.1 - 50.0		2	0.14 - 0.1

Si può prendere in considerazione l'uso di Loxicom® sospensione orale per cani per un dosaggio ancora più accurato. Si raccomanda l'uso di Loxicom® sospensione orale per cani di peso inferiore a 4 kg. Un miglioramento clinico si osserva di solito entro 3 - 4 giorni. Il trattamento deve essere sospeso dopo 10 giorni, se non appare un miglioramento clinico.

## 9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per assicurare il corretto dosaggio, determinare il peso degli animali il più accuratamente possibile per evitare sotto o sovra-dosaggio. Seguire attentamente le istruzioni del medico veterinario.

## 10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

## 11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Ogni mezza compressa può essere riposizionata nel blister e conservata fino a 24 ore.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Conservare nella confezione originale. Proteggere dalla luce. Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

## 12. AVVERTENZE SPECIALI

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Evitare l'uso in animali disidratati, ipovolemici o ipotesa, poiché esiste il potenziale rischio di tossicità renale.

Questo medicinale veterinario per cani non deve essere usato nei gatti, poiché non è adatto per questa specie. Nei gatti deve essere usata una sospensione orale autorizzata per tale specie a base di meloxicam (per esempio Loxicom® 0.5 mg/ml ad us vet., sospensione orale per gatti).

Esiste il rischio che i cani e gatti vadano in cerca delle compresse masticabili e le ingeriscano in quantità eccessive. Mantenere le compresse fuori dalla portata degli animali.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Le persone con nota ipersensibilità agli antinfiammatori non steroidei devono evitare contatti con il medicinale veterinario. In caso di auto-somministrazione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

### Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza ed l'allattamento non è stata stabilita.

### Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

L'uso di Loxicom® compresse in combinazione con altri medicinali (veterinari) può causare effetti tossici. Loxicom® compresse non deve essere somministrato contemporaneamente ad altri antinfiammatori (antiflogistici non steroidei o glucocorticosteroidi). La somministrazione simultanea di preparati potenzialmente nefrotossici dovrebbe essere evitata.

Una precedente terapia con altre sostanze antinfiammatorie può comportare una maggiore incidenza o gravità delle reazioni avverse e, di conseguenza, prima di iniziare il trattamento, si deve osservare un periodo di almeno 24 ore in cui questi farmaci non vengano somministrati. Durante il periodo di non somministrazione il veterinario dovrebbe tenere conto delle proprietà dei prodotti usati in precedenza.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

In caso di sovradosaggio avviare un trattamento sintomatico.

## 13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

11.11.2020

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Loxicom<sup>®</sup> 1 mg, 20 compresse in scatola

Loxicom<sup>®</sup> 1 mg, 100 compresse in scatola

Loxicom<sup>®</sup> 2.5 mg, 20 compresse in scatola

Loxicom<sup>®</sup> 2.5 mg, 100 compresse in scatola

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 65`306

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.