

# FiprocLEAR® Spot-on pour chats ad us. vet., solution

## Caractéristique abrégée

Solution insecticide et acaricide pour l'application externe

## Composition

Une pipette de 0,5 ml contient:

Fipronilum 50 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase 0,5 ml

## Propriétés/mode d'action

Le fipronil est un insecticide/acaricide appartenant à la famille des phénylpyrazolés. Il agit en inhibant le complexe GABA, en se fixant au canal chlore et en bloquant ainsi le transfert transmembranaire pré- et post-synaptique des ions chlorure. Cela se traduit par une activité incontrôlée du système nerveux central des insectes et des acariens et par leur mort.

Le fipronil exerce une activité insecticide contre les puces (*Ctenocephalides felis*) et une activité acaricide contre les tiques (*Ixodes ricinus*) chez le chat.

Après l'application, le produit se répartit bien sur les poils, présentant ainsi un bon gradient de concentration entre la zone d'application et la zone périphérique (zone lumbale et les flancs).

Avec le temps, les concentrations de fipronil diminuent dans le pelage et atteignent, 2 mois après le traitement, une concentration moyenne d'environ 1 µg/g de pelage. Chez le chat, le passage transcutané du fipronil est faible ainsi que le métabolisme cutané.

## Indications

Maladies provoquées chez le chat par des parasites sensibles au fipronil:

- Traitement et prophylaxie des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) et par les tiques chez les chats

- Élimination des poux broyeurs.

La protection contre une nouvelle infestation des puces dure 4 semaines et contre les tiques 2 semaines.

Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces.

## Mode d'emploi/posologie

1 Pipette de 0,5 ml par chat.


Application cutanée locale seulement.

En l'absence d'études d'innocuité, l'intervalle minimum entre deux traitements est de 4 semaines.

Casser l'embout de la pipette de solution pour spot-on le long de la ligne pré-entaillée.

Vider la pipette complètement et directement sur la peau, de préférence au niveau de deux points, à la base du cou et entre les deux épaules, en écartant les poils de l'animal pour éviter le léchage.

FiprocLEAR Spot-on peut être administré chez les chats gestantes ou en lactation.



Pour enlever la pipette du sachet, veuillez utiliser des ciseaux ou pliez le long de la ligne diagonale pour exposer la ligne déchirable(1)

Déchirez le sachet au niveau de la ligne déchirable et sortez la pipette(2)

Appliquez une torsion à l'embout pour ouvrir(3)

Écartez les poils de l'animal et appliquez sur la peau(4)

## Limitations d'emploi

### Contraindications

Ne pas utiliser chez des animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets indésirables parfois létaux peuvent se produire.

En l'absence de données disponibles, ne pas utiliser ce produit chez des chatons âgés de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 1 kg.

## Précaution d'emploi

Évitez des surdosages. En cas d'un surdosage le risque d'une évidence des intolérances est augmenté.

Il est important de s'assurer que le produit est appliqué sur une zone où l'animal ne pourra pas se lécher et de s'assurer que les animaux ne se lèchent pas entre eux après le traitement.

L'influence d'un bain ou d'un shampoing sur l'efficacité du produit vétérinaire chez le chat n'a pas été étudiée. Cependant, au vu de l'expérience faite chez le chien, les shampoings doivent être évités chez le chat dans les 2 jours suivant le traitement.

Quelques tiques peuvent occasionnellement se fixer sur les animaux traités.

Pour cette raison, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

## Effets indésirables

Si l'animal se lèche, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets indésirables extrêmement rares suspectés, des réactions cutanées transitoires au site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) et un prurit général ou de l'alopecie ont été rapportées après utilisation.

Dans des cas exceptionnels, une hypersalivation, des signes neurologiques réversibles (hyperesthésie, dépression, signes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation.

## Interactions

Aucune connue

## Remarques particulières

Les puces d'animaux domestiques infestent souvent le panier, les couvertures et les endroits de repos habituels, tels les moquettes et les tissus d'ameublement, qui doivent être traités dans les cas d'infestation massive et au début des mesures de lutte avec un insecticide adéquat et aspirés régulièrement.

Éviter le contact avec les yeux de l'animal.

Ce produit peut irriter les muqueuses et les yeux. En conséquence, éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les personnes et les animaux présentant une hypersensibilité connue au fipronil ou aux excipients doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. Éviter le contact du produit sur les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, bien rincer immédiatement les yeux avec de l'eau propre. Se laver les mains après utilisation. Les animaux traités ne devraient pas être manipulés et les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger durant l'application.

Le fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, les rivières et les ruisseaux avec le produit ou les conditionnements vides.

Médicament tenir hors de la portée des enfants

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage d'origine, en sec et à l'abri de la lumière.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Exp».

## Numéro d'autorisation

Swissmedic Nr.: 65'631

Catégorie de vente D

ATCvet: QP53AX15

## Présentations

Boîtes à 3 pipettes et à 24 pipettes

## Mise à jour de l'information

Février 2016

## Titulaire de l'autorisation

ufamed SA, 6210 Sursee