

Fiproclear® Spot-on per gatti ad us. vet., soluzione

Caratteristiche del prodotto

Soluzione insetticida e acaricida per applicazione topica cutanea

Composizione

Una pipetta contiene:

Fipronilum 50 mg

Antiox.: E 320, E 321

Excipients q.s. pro vase 0,5 ml

Proprietà/effetti

Il fipronil è un insetticida/acaricida della famiglia dei fenilpirazoli. Agisce inibendo il complesso GABA legandosi al canale del cloruro e quindi bloccando il trasferimento pre- e post-sinaptico degli ioni cloruro attraverso la membrana. Questo causa l'attività incontrollata del sistema nervoso centrale e la morte degli insetti e degli acaridi.

Il fipronil esibisce un'attività insetticida contro le pulci (*Ctenocephalides felis*) e un'attività acaricida contro le zecche (*Ixodes ricinus*) nel gatto.

Dopo l'applicazione sulla pelle dell'animale si instaura un gradiente di concentrazione di fipronil del punto di applicazione in direzione delle zone periferiche (zona lombare, fianchi). Le concentrazioni di fipronil sul pelo diminuiscono nel corso del tempo raggiungendo una concentrazione media di circa 1 µg/g di pelo due mesi dopo il trattamento. Nei gatti il passaggio transcutaneo e la metabolizzazione cutanea di fipronil sono deboli.

Indicazioni

Malattie causate nei gatti da parassiti sensibili a fipronil:

- Per il trattamento e la profilassi delle infestazioni da zecche e da pulci (*Ctenophalides felis*)

- Eliminazione da pidocchi

L'azione protettiva contra una nuova infestazione da pulci dura fino a 4 settimane e 2 settimane contro le zecche.

Il prodotto può essere utilizzato quale parte di una strategia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci in casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.

Posologia e via di somministrazione


1 pipetta da 0,5 ml per un gatto.

Applicazione topica cutanea solamente.

In mancanza di studi sulla sicurezza, l'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.

Svuotare la pipetta, preferibilmente in due punti, completamente e direttamente sulla cute all'attaccatura del collo e tra le scapole per impedire all'animale di leccarsi. Nell'applicazione separare il pelo.

Fiproclear Spot-on può essere usato nelle cagne gravide o in allattamento.



Per rimuovere la pipetta dalla bustina, utilizzare le forbici o piegare lungo la linea diagonale per esporre la tacca(1)

Piegare lungo la linea diagonale per esporre la tacca(2)

Strappare all'indietro in corrispondenza della tacca(3)

Girare la parte superiore per aprire(4)

Limitazioni d'uso

Controindicazioni

Non usare in animali malati (malattie sistemiche, febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

In assenza di dati disponibili, il prodotto non deve essere usato in gattino di età inferiore a 8 settimane o in gatti con peso inferiore a 1 kg.

Misure precauzionali

Evitare sovradosaggio. Il rischio di insorgenza di effetti avversi potrebbe comunque aumentare in caso di sovradosaggio.

È importante assicurarsi che il prodotto sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi nonché controllare che gli animali non si leccino a vicenda dopo il trattamento. L'influsso di bagni/shampoo sull'efficacia del medicamento per uso veterinario nei gatti non è stato studiato. Tuttavia, sulla base dell'esperienza sui cani, si consiglia di non fare lo shampoo al gatto nei due giorni successivi al trattamento.

Le zecche potrebbero attaccarsi all'animale. Per questo motivo, la trasmissione di malattie infettive non può essere completamente esclusa in presenza di condizioni sfavorevoli.

Effetti indesiderati

Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente alla natura degli eccipienti.

Tra le sospette reazioni avverse estremamente rare, sono state riportate reazioni cutanee transitorie nel sito di applicazione (decolorazione della cute, alopecia locale, prurito, eritema) e prurito diffuso o alopecia dopo l'applicazione. In casi eccezionali sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), o vomito.

Interazioni

Nessuna conosciuta

Altre indicazioni

Le pulci presenti sugli animali domestici spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare moquette, tappeti, tende e tessuti d'arredamento che, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, vanno trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

Evitare che il contenuto venga a in contatto con gli occhi. Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia pertanto di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi.

Le persone e gli animali con nota ipersensibilità al fipronil o ai suoi eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto venga in contatto con le mani. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.

Non toccare gli animali trattati e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a quando il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia pertanto di non trattare gli animali durante il giorno, ma nelle prime ore della sera e, se appena trattati, di non far dormire gli animali con i proprietari, in particolare con i bambini.

Il fipronil potrebbe avere un effetto avverso sugli organismi acquatici. Il fipronil no deve essere gettato in corso o uno specchio d'acqua.

Conservare fuori dalla portata dei bambini

Conservare a temperature inferiori a 25 °C, nel contenitore originale e protetto dall'umidità e dalla luce.

Il farmaco non deve essere utilizzato dopo la data indicata con "EXP" sul ventic.

Numero dell'omologazione

Swissmedic N.: 65'631

Categoria di dispensazione: (D)

ATCvet: QP53AX15

Confezioni

Scatola con 3 pipette e 24 pipette

Stato dell'informazione:

02.2016

Titolare dell'autorizzazione

ufamed AG, 6210 Sursee

