

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Effipro® Duo Spot-on chat S/M ad us. vet., solution pour application cutanée

Effipro® Duo Spot-on chat L/XL ad us. vet., solution pour application cutanée

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicile:
Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06510 Carros,
France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Effipro Duo Spot-on chat S/M ad us. vet., solution pour application cutanée

Effipro Duo Spot-on chat L/XL ad us. vet., solution pour application cutanée

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 pipette contient:

Substances actives:

Taille de la pipette	Volume (ml)	Fipronil (mg)	Pyriproxifène (mg)
Effipro Duo Spot-on chat S/M <i>pour chats de 1–6 kg</i>	0,5	50	60
Effipro Duo Spot-on chat L/XL <i>pour chats de > 6–12 kg</i>	1,0	100	120

Excipients:

Taille de la pipette	Volume (ml)	Butylhydroxyanisole (E320) (mg)	Butylhydroxytoluène (E321) (mg)
Effipro Duo Spot-on chat S/M <i>pour chats de 1–6 kg</i>	0,5	0,1	0,05
Effipro Duo Spot-on chat L/XL <i>pour chats de > 6–12 kg</i>	1,0	0,2	0,1

Solution pour application cutanée. Solution claire, incolore à jaunâtre.

4 INDICATION(S)

Chez les chats et les chatons (âge minimal 10 semaines; poids corporel minimal 1 kg): Contre les infestations par les puces, seules ou mixtes avec une infestation par les tiques.

Puces (Ctenocephalides felis):

- Traitement et prévention des infestations par les puces. Une application prévient d'une nouvelle infestation pendant 5 semaines.
- Prévention de la multiplication des puces en empêchant le développement des œufs de puce pendant 12 semaines après application.
- Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP) si ce diagnostic a été préalablement réalisé par un vétérinaire.

Tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus):

- Traitement des infestations par les tiques.
- Une application unique permet un effet acaricide qui persiste pendant 1 semaine.
- Si des tiques sont déjà présentes au moment de l'application du médicament vétérinaire, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 48 heures.

5 CONTRE-INDICATIONS

En l'absence de données, ne pas utiliser chez les chatons de moins de 10 semaines et/ou avec un poids corporel de moins de 1 kg.

Ne pas utiliser chez le lapin, des effets indésirables parfois létaux pouvant survenir.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'une des substances actives ou à l'un des excipients.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Des modifications d'aspect transitoires, notamment un aspect mouillé ou une légère desquamation, peuvent être observées au site d'application. Si l'animal se lèche, un bref épisode d'hypersalivation peut être observé, principalement lié à la nature du solvant. Selon l'expérience accumulée sur les deux substances actives administrées sous forme de spot-on, des réactions cutanées transitoires au site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème, altération de la couleur de la peau), ainsi qu'un prurit ou une alopecie généralisés peuvent être observés. Dans de très rares cas, une hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, signes nerveux), des troubles respiratoires ou des vomissements peuvent survenir.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires chez l'animal traité, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chat

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

À usage externe. Solution pour application cutanée.

La dose minimale recommandée est de 8,3 mg/kg de fipronil et de 10 mg/kg de pyriproxifène.

Poids du chat	Présentation	Volume (ml)	Fipronil (mg)	Pyriproxifène (mg)
1–6 kg	Effipro Duo Spot-on chats S/M	0,5	50	60
> 6–12 kg	Effipro Duo Spot-on chats L/XL	1,0	100	120

L'intervalle minimum entre deux applications est de 4 semaines.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE


Il est important d'appliquer le médicament vétérinaire sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de s'assurer que les animaux traités ne se lèchent pas entre eux. Ces endroits sont situés à la base du cou, devant les omoplates, et au milieu du cou, entre la base du crâne et les omoplates.

Extraire la pipette du blister, la tenir en position verticale. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que le contenu soit bien descendu dans la partie centrale de la pipette. Rompre l'extrémité autocassable de la pipette en suivant la ligne gravée.

Écarter les poils de l'animal à la base du cou, en avant des omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette directement sur la peau et presser doucement plusieurs fois la pipette pour vider le contenu sur un ou deux sites de peau saine. Éviter que le liquide ne coule sur les flancs ou reste trop superficiellement dans le poil.



Système Drop-Stop: le produit est libéré uniquement par pression sur la partie centrale de la pipette.



10 TEMPS D'ATTENTE

Non applicable

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans l'emballage d'origine pour protéger le contenu de la lumière.

A conserver dans un endroit sec. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Surtout en cas de forte infestation et au début de la lutte contre les puces des animaux de compagnie, les paniers, les zones de couchage et les zones de repos habituelles comme par exemple les tapis et les canapés devront être traités avec un insecticide approprié et aspirés régulièrement.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Il est important d'appliquer le médicament vétérinaire sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de s'assurer que les animaux traités ne se lèchent pas entre eux.

Ce médicament vétérinaire peut entraîner une irritation des muqueuses et des yeux. Pour cela, éviter tout contact avec la bouche et les yeux.

Ne pas appliquer le médicament vétérinaire sur des plaies ou sur des lésions cutanées.

L'innocuité de ce produit n'a pas été étudiée chez des animaux malades ou affaiblis.

L'influence des baignades/shampooings sur l'efficacité du médicament vétérinaire n'a pas été étudiée chez le chat. Si un shampooing s'avère nécessaire pour le chat, il est mieux de le faire *avant le traitement*.

Des tiques peuvent occasionnellement être observées aussi chez les animaux traités. La transmission d'une maladie infectieuse par des tiques ne peut donc être complètement exclue en cas de conditions défavorables. Une fois mortes, les tiques se détachent généralement de l'animal. Toute tique restante devra être retirée avec précaution, en s'assurant que les pièces buccales ne restent pas dans la peau.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Les animaux et les utilisateurs avec une hypersensibilité connue aux insecticides et à l'alcool ne doivent pas entrer en contact avec le médicament.

Le produit peut occasionner des troubles neurotoxiques. Le produit peut être nocif en cas d'ingestion accidentelle.

La préparation peut provoquer une irritation des yeux et des muqueuses, il faut donc éviter tout contact avec la peau, la bouche et les yeux. Évitez l'ingestion ainsi que le contact main-bouche et main-œil.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application du produit.

En cas de contact accidentel de la préparation avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Se laver les mains après utilisation.

Tant que le site d'application n'est pas sec, ne pas toucher les animaux traités et ne pas laisser les enfants jouer avec eux. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et les animaux une fois traités ne doivent pas être autorisés à dormir avec leurs maîtres, en particulier les enfants. Conserver les pipettes dans leur emballage d'origine et les éliminer immédiatement après utilisation de façon appropriée. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement à l'eau. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui présenter la notice ou l'emballage.

Autres précautions:

Le solvant alcoolique peut détériorer certains matériaux, par exemple des surfaces peintes, vernies ou autres surfaces ou meubles. Par conséquent, laissez le site d'application sécher avant d'entrer en contact avec de tels matériaux.

Gestation et lactation:

Les études de laboratoire réalisées sur le fipronil et le pyriproxifène n'ont mis en évidence aucun effet tératogène ou embryotoxique. Aucune étude n'a été réalisée avec ce médicament vétérinaire chez des chattes gravides ou allaitantes. L'utilisation du produit pendant la gestation ou la lactation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire traitant.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Aucune connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Aucun effet indésirable grave n'a été observé au cours d'une étude d'innocuité réalisée sur des chatons de 10 semaines, traités avec jusqu'à 5 fois la dose maximale recommandée 3 fois à 4 semaines d'intervalle, et traités avec la dose maximale recommandée 6 fois à 4 semaines d'intervalle. Le risque d'effets indésirables peut cependant augmenter en cas de surdosage, il faut donc toujours traiter les animaux avec la taille de pipette adaptée à leur poids corporel.

Incompatibilités:

Aucune connue.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Le fipronil et le pyriproxifène peuvent nuire aux organismes vivant dans l'eau. Les étangs, les plans d'eau ou les cours d'eau ne doivent pas être contaminés par le médicament vétérinaire ou les récipients vides. Les médicaments vétérinaires ne doivent pas être éliminés avec les eaux usées ou par les égouts.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

05.03.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les pipettes sont emballées individuellement dans un blister en plastique/aluminium.

Effipro Duo Spot-on chat S/M ad us. vet., solution pour application cutanée

Conditionnement avec 4 pipettes de 0,5 ml chacune

Conditionnement avec 24 pipettes de 0,5 ml chacune

Effipro Duo Spot-on chat L/XL ad us. vet., solution pour application cutanée

Conditionnement avec 4 pipettes de 1,0 ml chacune

Conditionnement avec 24 pipettes de 1,0 ml chacune

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 65'705

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.