

## INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Propentotab<sup>®</sup> 100 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani

#### **1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.**

Titolare dell'omologazione:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Germania

#### **2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Propentotab 100 mg ad us. vet., compresse masticabili per cani

#### **3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

1 compressa masticabile contiene:

**Principio attivo:** Propentofillina 100 mg

Compressa masticabile rotonda, da colore crema a marrone chiaro, con doppia tacca di rottura su un lato.

#### **4 INDICAZIONE(I)**

Disturbi legati all'età nel cane (disturbi circolatori).

#### **5 CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare su cani con un peso corporeo inferiore a 5 kg.

#### **6 EFFETTI COLLATERALI**

In seguito alla somministrazione di Propentotab possono raramente comparire reazioni cutanee allergiche (per es. orticaria) che rendono necessaria l'interruzione del trattamento. In rari casi è stato osservato vomito, in particolare all'inizio della terapia. In casi molto rari possono comparire dolori addominali, perdita dell'appetito, diarrea, zoppia, iperattività, dispnea, battito cardiaco accelerato e collasso.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informare il medico veterinario o il farmacista.

## **7 SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cane

## **8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

La dose giornaliera è di 6 – 10 mg di propentofillina / kg di peso corporeo. Questo dovrebbe essere somministrato in due dosi singole di 3 – 5 mg/kg di peso corporeo ciascuna come segue:

Peso corporeo (kg)	Compresse masticabili		Numero di compresse masticabili al giorno
	mattina	sera	
5 – 8 kg	¼	¼	½
9 – 16 kg	½	½	1
17 – 30 kg	1	1	2
31 – 50 kg	1½	1½	3
51 – 66 kg	2	2	4
67 – 90 kg	3	3	6

## **9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Un dosaggio più accurato può essere ottenuto dando quarti della compressa da 100 mg. Le compresse masticabili possono essere date direttamente o mescolate in una piccola quantità di mangime, ma dovrebbero essere date almeno 30 minuti prima del pasto.

## **10 TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11        PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP. Le compresse divise rimesse nel blister aperto e conservate nel cartone fino alla prossima somministrazione hanno una durata di conservazione di 4 giorni.

## **12        AVVERTENZE SPECIALI**

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Dato che le compresse masticabili sono aromatizzate, c'è il rischio che i cani le cerchino appositamente e le ingeriscano in dosaggi eccessivi. Le compresse masticabili di Propentotab devono quindi essere tenute fuori dalla portata degli animali.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In caso di significativa riduzione della funzionalità renale, la dose deve essere diminuita.

Se durante la somministrazione del farmaco non dovesse subentrare alcun miglioramento dei sintomi provocati dai disturbi circolatori, a seconda del tipo di malattia, il trattamento dovrà essere interrotto tempestivamente, al massimo entro 4 settimane.

Propentotab deve essere somministrato quotidianamente e per un lungo periodo di tempo o permanentemente, ed è necessario verificare di tanto in tanto la tollerabilità. A seconda degli aspetti clinici, l'efficacia del medicamento può manifestarsi già dopo pochi giorni. In caso di interruzione del trattamento c'è da aspettarsi una lenta ricomparsa dei sintomi.

### Gravidanza e allattamento:

A causa della mancanza di dati sperimentali, non è consigliabile l'impiego su cagne gravide ed animali da riproduzione.

### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Sono stati osservati sintomi di iper-stimolazione cardiaca e cerebrale. In questi casi gli animali vanno sottoposti a terapia sintomatica.

## **13        PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL           PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali non più necessari. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

## **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

15.06.2021.

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15 ALTRE INFORMAZIONI**

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Scatola pieghevole con 100 compresse masticabili (quarabili).

Swissmedic 65'820

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.