

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Drontal Plus Tasty ad us. vet., comprimés pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berne

Téléphone: 031 818 56 56

Email: info.switzerland@vetoquinol.com

Fabricants responsables de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

Europhartech

34 rue Henri Matisse

F – 63370 Lempdes

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Drontal Plus Tasty ad us. vet., comprimés pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

Substances actives:

Praziquantel	50 mg
Pyrantel (soit 144 mg d'embonate de pyrantel)	50 mg
Fébantel	150 mg

Comprimé brun clair à brun, aromatisé au goût de viande, en forme d'os, sécable, à couper en deux avec une ligne de sécabilité sur les deux faces.

4 INDICATION(S)

Chez les chiens, traitement des vers ronds (ascaris, ankylostomes et oxyures) et des vers plats (dont *ténia du renard*, *ténia tripartite du chien* et *ténia du concombre*).

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un principe actif ou à un autre composant du médicament vétérinaire.

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les deux premiers tiers de la gestation.

Un traitement unique au cours du dernier tiers de la gestation ou pendant la lactation s'est avéré bien toléré.

Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 2 kg.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas (moins d'1 animal sur 10'000 animaux traités), des troubles digestifs bénins et transitoires tels que vomissements et/ ou diarrhée peuvent survenir. Dans des cas individuels ces effets peuvent s'accompagner de signes non spécifiques telle que l'inertie, la perte d'appétit ou une activité accrue.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Sauf prescription contraire, 1 comprimé par 10 kg de poids corporel est administré pour une vermifugation complète, ce qui correspond aux quantités suivantes de substances actives par kg de poids corporel: 15 mg de fébantel, 5 mg de pyrantel et 5 mg de praziquantel.

Le dosage est le suivant:

Poids corporel (kg)	Nombre de comprimés
2 - 5	½
> 5 - 10	1
> 10 - 15	1½
> 15 - 20	2

Ajouter un demi-comprimé pour chaque tranche de 5 kg de poids corporel supplémentaire.

Durée du traitement

La préparation est administrée en une seule fois. En cas d'infestation de vers diagnostiquée, il faut toujours procéder à une vermifugation immédiate avec un nouveau traitement après 2 semaines.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les comprimés sont administrés directement à l'animal. Ils sont aromatisés et sont donc ingérés volontairement par la majorité des chiens (88% selon une étude). Les comprimés peuvent être administrés avec ou sans nourriture. Des mesures diététiques ne sont pas nécessaires pour les chiens adultes ni pour les chiots.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

La préparation ne doit pas être utilisée au-delà de la date de péremption figurant après la mention «Expiry» sur le blister.

Les demi-comprimés qui ne sont pas utilisés le même jour doivent être enveloppés dans une feuille d'aluminium et remis dans le blister ouvert. Délai d'utilisation des demi-comprimés: 7 jours.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Les puces sont importantes pour la reproduction du ténia du concombre (*Dipylidium caninum*) très répandu.

L'infestation par les vers plats peut réapparaître à moins que des mesures de contrôle contre les puces, les souris, etc. ne soient entreprises.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

En outre, les comprimés ayant une forme d'os, il y a un risque de confusion avec des friandises pour chien. Pour cette raison, les comprimés ne doivent être conservés que dans leur emballage d'origine. L'usage fréquent et répété d'un anthelminthique d'une même classe peut conduire au développement de résistance aux anthelminthiques de cette classe.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

En cas de présence d'une échinococcose chez votre chien (infection avec le *ténia du renard* ou le *ténia tripartite du chien*) il existe un risque de contagion pour l'homme. Des directives particulières doivent être suivies en ce qui concerne le traitement, les contrôles ultérieurs et la protection des personnes. Il convient de consulter un vétérinaire spécialisé ou un institut de parasitologie.

Gestation et lactation:

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les deux premiers tiers de la gestation.

Un traitement unique au cours du dernier tiers de la gestation ou pendant la lactation s'est avéré bien toléré.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

En raison d'une possible diminution de l'efficacité, la préparation ne doit pas être administrée en même temps que certains autres vermifuges. Demandez à votre vétérinaire de plus amples informations.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

27.01.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîtes de 6, 24 et 102 comprimés

Emballage avec 17 boîtes de 6 comprimés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 66277

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.