

## INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Drontal Plus Tasty ad us. vet., compresse per cani

#### 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berna

Telefono: 031 818 56 56

Fabbricanti responsabili del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

Europhartech

34 rue Henri Matisse

F – 63370 Lempdes

#### 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Drontal Plus Tasty ad us. vet., compresse per cani

#### 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

##### Principi attivi:

Praziquantel	50 mg
Pirantel (come 144 mg di piranilembonato)	50 mg
Febantel	150 mg

Compresse da marrone chiaro a marrone, con aroma di carne, a forma di osso, divisibili, da dividere a metà con scanalatura di rottura su entrambi i lati.

#### 4 INDICAZIONE(I)

Nei cani, trattamento degli ascaridi (vermi tondi, anchilostomi e ossiuri) e delle tenie (tra cui *tenia della volpe*, *tenia tripartite del cane* e *tenia del cetriolo*).

## **5           CONTROINDICAZIONI**

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente del medicinale veterinario.

Non usare in cagne durante i primi due terzi della gravidanza.

Un singolo trattamento nell'ultimo terzo della gravidanza o durante l'allattamento ha dimostrato di essere tollerato.

Non utilizzare in cani di peso inferiore a 2 kg.

## **6           EFFETTI COLLATERALI**

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10'000 animali trattati), possono verificarsi disturbi digestivi lievi e transitori (come vomito e/o diarrea). In singoli casi, questi sintomi possono essere accompagnati da sintomi non specifici come pigrizia, perdita di appetito o aumento dell'attività.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## **7           SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cane

## **8           POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Se non diversamente prescritto, si somministra 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo per una sverminazione completa, che corrisponde alle seguenti quantità di sostanza attiva per kg di peso corporeo: 15 mg di febantel, 5 mg di pyrantel e 5 mg di praziquantel.

Il dosaggio è come segue:

Peso corporeo (kg)	Numero di compresse
2 - 5	½
> 5 - 10	1
> 10 - 15	1½
> 15 - 20	2

Mezza compressa deve essere aggiunta per ogni 5 kg in più di peso corporeo.

### *Durata del trattamento*

La preparazione viene somministrata in una sola volta. In caso di infestazione da vermi diagnosticata, la sverminazione immediata è sempre necessaria, con un nuovo trattamento dopo 2 settimane.

## **9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Le compresse sono somministrate direttamente all'animale. Sono aromatizzate e sono quindi ingerite volontariamente dalla maggior parte dei cani (88% secondo uno studio). Le compresse possono essere somministrate con o senza cibo. Misure dietetiche non sono necessarie per cani adulti o cuccioli.

## **10 TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sui blister con la dicitura «Expiry».

Le compresse dimezzate che non vengono consumate nello stesso giorno devono essere avvolte in un foglio di alluminio e rimesse nel blister aperto. Periodo d'utilizzo di compresse divise a metà: 7 giorni.

## **12 AVVERTENZE SPECIALI**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Le pulci sono importanti per la riproduzione della diffusa tenia del cetriolo (*Dipylidium caninum*).

Una nuova infestazione di tenia può verificarsi se non viene effettuato il controllo di pulci, topi ecc.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Poiché il medicinale veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti lo cerchino e lo ingeriscano in quantità accessiva. Per questo motivo, tenere le compresse fuori dalla portata degli animali.

Inoltre, c'è il rischio di confusione con i croccantini per cani a causa della forma delle compresse a forma di osso. Per questo motivo, le compresse devono essere conservate solo nella loro confezione originale.

L'uso frequente e ripetuto di un antielmintico della stessa classe può portare allo sviluppo di resistenza agli antielmintici di quella classe.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Se il vostro cane ha l'echinococcosi (infezione con la *tenia della volpe* o la *tenia tripartite del cane*), c'è un rischio di infezione per l'uomo. Devono essere seguite linee guida speciali per quanto riguarda

il trattamento, i controlli successivi e la protezione personale. Per questo si deve consultare un veterinario specializzato o un istituto di parassitologia.

#### Gravidanza e allattamento:

Non usare in cagne durante i primi due terzi della gravidanza.

Un singolo trattamento nell'ultimo terzo della gravidanza o durante l'allattamento ha dimostrato di essere tollerato.

#### Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

A causa della possibile compromissione dell'effetto, il preparato non dovrebbe essere somministrato contemporaneamente a alcuni altri agenti sverminanti. Chiedete al vostro veterinario per maggiori informazioni.

#### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi relativi a sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

### **13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

### **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

27.01.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 ALTRE INFORMAZIONI**

Scatola da 6, 24 e 102 compresse

Confezione da 17 scatole da 6 compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 66277

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.