

Therios 75

ad us.vet.
Comprimés à croquer sécables
Antibiotique céphalosporine pour chats.

Composition

1 comprimé contient :
Substance active : céfalexine (sous forme de monohydrate) 75 mg
Aromes
Excipients

PROPRIÉTÉS/EFFETS

La céfalexine est un antibiotique bactéricide semi-synthétique de la famille des céphalosporines. Elle agit par inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Elle est résistante à l'action des bêta-lactamases produites par les bactéries à Gram-positif. Son spectre d'activité comprend les bactéries à Gram-positif et Gram-négatif : staphylocoques (y compris ceux produisant des pénicillinases), streptocoques, pneumocoques, Clostridium, E. coli, Klebsiella, Salmonella et Shigella. Grâce à leurs propriétés et effets, les comprimés à croquer Therios 75 sont le traitement de choix dans le cas des infections à staphylocoques, en particulier dans les affections de la peau. L'utilisation routinière dans les cas d'infections banales n'est pas recommandée.

PHARMACOCINÉTIQUE

Chez le chat, par voie orale, la biodisponibilité est de l'ordre de 56 %.

Chez le chat, le pic plasmatique de céfalexine de 22 µg/ml est atteint 1,6 heure après administration orale unique de 18.6 mg/kg de céfalexine. La céfalexine est détectée dans le plasma jusqu'à 24 heures après administration. La céfalexine possède une excellente diffusion tissulaire. L'élimination de la céfalexine s'effectue essentiellement (85 %) par voie urinaire sous forme active, les pics de concentration urinaire sont très supérieurs aux pics de concentration plasmatique.

INDICATIONS

Traitement des maladies infectieuses bactériennes causées par des germes sensibles à la céfalexine (staphylocoques essentiellement).
Chats, en particulier en cas d'infections

- cutanées : pyodermites superficielles et profondes.
- urinaires : néphrites, cystites,
- respiratoires.
- Infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès).

POSOLOGIE/MODE D'EMPLOI

Le dosage usuel des comprimés à croquer Therios 75 est de 30 mg/kg de poids corporel/jour réparti en 2 prises (1 le matin et 1 le soir).
Therios 75 : 2x1 comprimé à croquer par 5 kg/poids corporel
La durée du traitement varie en fonction de la sévérité du cas :

- 5 jours pour les plaies et abcès
- 10 à 14 jours pour les infections urinaires basses,

- 14 jours au minimum pour les pyodermites. Le traitement doit être poursuivi 10 jours après disparition des lésions.

Voie orale.

Le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible afin de garantir un dosage correct et d'éviter tout sous-dosage.

Les comprimés sont aromatisés. Ils peuvent être administrés avec un peu de nourriture ou directement dans la gueule de l'animal.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Contre-indications :

Allergie aux céphalosporines.

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance rénale grave.

Ne pas utiliser chez les animaux présentant une hypersensibilité connue aux céphalosporines ou à toute autre substance du groupe des bêta-lactames.

Ne pas administrer aux lapins, cochons d'Inde, hamsters, gerbilles ou autres petits rongeurs.

L'utilisation du produit est contre-indiquée quand une résistance à la céfalexine est connue.

Précautions :

Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Diminuer la dose en cas d'insuffisance rénale.

Ce produit ne doit pas être utilisé chez des chatons de moins de 9 semaines. L'utilisation du produit chez les chats de moins de 2,5 kg devra faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfice risque par le vétérinaire traitant.

Les études menées sur les animaux de laboratoire n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène de la céfalexine. L'innocuité du produit n'a pas été évaluée chez la chatte en gestation ou en lactation. L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

EFFETS INDÉSIRABLES

Dans certains cas rares, des vomissements et des cas de diarrhée ont été observés après l'administration de Therios. Cependant, le fait d'administrer les comprimés à croquer avant le repas permettrait d'éviter ces effets inattendus dans une large mesure.

INTERACTIONS

L'effet bactéricide des céphalosporines est neutralisé par l'utilisation simultanée de composés à action bactériostatique (macrolides, sulfonamides et tétracyclines). L'association de céphalosporines de première génération avec des antibiotiques polypeptidiques, les aminoglycosides et certains diurétiques (furosémide) peut accroître la néphrotoxicité. L'utilisation concomitante de ces substances devra être évitée.

REMARQUES PARTICULIÈRES

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage d'origine.
Les demi-comprimés doivent être conservés dans l'emballage blister et être utilisés dans un délai de 24 heures.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date imprimée (Exp).

Les pénicillines et les céphalosporines peuvent entraîner des réactions d'hypersensibilité (allergie) après injection, inhalation, ingestion ou contact cutané. Cette hypersensibilité aux pénicillines peut entraîner des réactions croisées avec les céphalosporines, et inversement.
Ces réactions d'hypersensibilité peuvent être occasionnellement graves.

Ne pas manipuler ce produit si vous savez être sensibilisé, ou s'il vous a été conseillé de ne pas entrer en contact avec ce type de molécule.
Manipuler le produit avec soins en prenant toutes les précautions pour éviter toute exposition inutile. Se laver les mains après manipulation. En cas de symptômes après exposition (rougeur cutanée), demander un avis médical en présentant la notice au médecin. Un œdème de la face, des lèvres ou des yeux, ou des difficultés respiratoires constituent des signes graves, qui nécessitent un traitement médical urgent.

PRÉSENTATIONS

Emballage de 1 ou 10 blisters de 10 comprimés à croquer sécables

Swissmedic 66'593(A)
ATCvet code : QJ01DB01

Titulaire de l'autorisation
Biokema SA,
Crissier-Lausanne

Mise à jour de l'information: janvier 2018