

INFORMATION FÜR TIERHALTERINNEN UND TIERHALTER

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Prevendog[®] S ad us. vet., Halsband für kleine Hunde

Prevendog[®] M ad us. vet., Halsband für mittlere Hunde

Prevendog[®] L ad us. vet., Halsband für grosse Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg
Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: AB7 Santé, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Frankreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Prevendog S ad us. vet., Halsband für kleine Hunde

Prevendog M ad us. vet., Halsband für mittlere Hunde

Prevendog L ad us. vet., Halsband für grosse Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 graues Halsband enthält:

Wirkstoff:

	Länge / Gewicht	Deltamethrin
Prevendog S für kleine Hunde	35 cm / 15,9 g	0,64 g
Prevendog M für mittlere Hunde	60 cm / 26,4 g	1,06 g
Prevendog L für grosse Hunde	75 cm / 32,6 g	1,30 g

Wirkstoffhaltiges, graues Halsband aus Kunststoff mit integrierter Verschlusschnalle.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Tierarzneimittel gegen Floh- und Zeckenbefall, zur Vorbeugung der Leishmaniose und zur Verminderung von Stichen durch Culexmücken (Moskitos).

Hund:

- Zur Verhinderung des Befalls mit Flöhen (*Ctenocephalides felis*) während 4 Monaten,
- zur Verhinderung des Befalls mit Zecken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) während 6 Monaten,
- zur Verhinderung des Blutsaugens durch die sogenannte "Sandfliege" (Schmetterlingsmücke = *Phlebotomus perniciosus*) für die Dauer von 5 bis 6 Monaten (Schmetterlingsmücken übertragen beim Blutsaugen die Erreger der Leishmaniose),
- zur Verhinderung von Stichen durch Culex-Stechmücken (*Culex pipiens pipiens*) während 6 Monaten.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden.

Nicht bei Hunden mit ausgedehnten Hautverletzungen anwenden.

Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil anwenden.

Nicht bei Katzen anwenden

Der Wirkstoff von Prevendog ist ausserordentlich giftig für Katzen. Prevendog darf auf keinen Fall bei Katzen angewendet werden. Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen wie starke Muskelkrämpfe und Bewegungsstörungen können die Folge sein, die zum Tod der Katze führen können.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen zu lokalen Hautveränderungen, Rötung, Juckreiz und Haarausfall führen. Sehr selten können neurologische Symptome wie Zittern und Teilnahmslosigkeit auftreten. In solchen Fällen sollte das Halsband entfernt werden. Die Symptome klingen danach innerhalb von 48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll eine Tierärztin / ein Tierarzt aufgesucht werden.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermassen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10 000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10 000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur äusserlichen Anwendung.

Ein Halsband pro Hund.

Das Halsband kann ab einem Alter von 7 Wochen eingesetzt werden.


9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Das Halsband wird aus der versiegelten Schutzhülle entnommen, entrollt (1) und dem Hund locker um den Hals gelegt (2). Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollten zwei Finger breit Platz verbleiben (3). Das Ende wird durch die Schnalle geführt und die über 5 cm überstehenden Reste abgeschnitten (4).

Das Halsband entfaltet seine volle Wirkung nach einer Woche und sollte daher vorzugsweise eine Woche vor einem möglichen Befall der Tiere angelegt werden.

Das Schwimmen des Hundes sollte in den ersten 5 Tagen nach Anlegen des Halsbandes verhindert werden.

Das Halsband behält seine Wirkung über einen Zeitraum von 4 Monaten (Flöhe) bzw. bis zu 6 Monaten (Zecken, Schmetterlingsmücke, Stechmücken).



10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30 °C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Es ist empfehlenswert, neben der Einzeltierbehandlung geeignete Mittel zur Flohbekämpfung in der Umgebung des Hundes einzusetzen. In seltenen Fällen kann es während des Tragens des Halsbandes zum Festsetzen von Zecken kommen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Gelegentlicher Kontakt mit Wasser beeinträchtigt die Wirksamkeit des Halsbandes nicht, jedoch sollte das Halsband vor dem Baden des Hundes abgenommen werden, da der Wirkstoff für Fische und andere im Wasser lebende Organismen giftig ist.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender:

Es ist zu verhindern, dass Kleinkinder das Halsband anfassen, damit spielen oder es in den Mund nehmen.

Nach Anlegen des Halsbandes sollten die Hände mit kaltem Wasser und Seife gereinigt werden.

Trächtigkeit und Laktation:

Prevendog kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht zusammen mit gewissen anderen Arzneimitteln gegen äussere Parasiten anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Sollte der Hund das Halsband fressen, können folgende Symptome auftreten: unkoordinierte Bewegungen, Zittern, Speicheln, Erbrechen und Steifheit der Hintergliedmassen. Diese Symptome klingen innerhalb von 48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll eine Tierärztin / ein Tierarzt aufgesucht werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Der Wirkstoff von Prevendog ist giftig für Fische und Bienen. Auch nach dem Gebrauch darf das Halsband nicht in die Umwelt oder in Gewässer gelangen.

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

13.08.2024

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Faltschachtel mit 1 Halsband, verpackt in einem Kunststoff-Aluminiumbeutel (alle Dosisstärken bzw. alle Halsbandgrössen)

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 67'050

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der in der Rubrik 1 genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.